Изданіе общества им. мих. качковского.

636.5
Ok72

Май 1910.

О КУРАХЪ.

Цѣна 50 гел.

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

ELIAS CZAYKOWSKY
COLLECTION OF
UKRAINIAN CULTURE

636.5
Ok72

ИЗДАНІЯ ОБЩЕСТВА имени МИХ. КАЧКОВСКОГО.

Мѣсяцъ Май 1910. Ч. 413.

О КУРАХЪ

ихъ лучшихъ породахъ, розведеніи, держаніи, кормленіи и доходности изъ нихъ.

По новѣйшимъ руководствамъ составлено.

ЛЬВОВЪ 1910.
Изъ типографіи Ставропигійского Института
подъ управ. М. Рефця.

За редакцію отвѣчае: Филиппъ Ив. Свистунъ.

636.5
Ок72

Нашихъ жидôвъ считаютъ людьми практичными и по справедливости. На примѣръ предусмотрительный жидъ-посессоръ большого землевладѣнія есть не только арендаторомъ помѣщичьей земли, а и ливерантомъ н. пр. соломы для конницы стаціонующей въ ближайшемъ городку, войсковымъ поставщикомъ мяса для гарнизона въ ближайшей мѣстности, арендаторомъ мытъ на гостинцахъ и пр. — или ведетъ при томъ якое другое предпринимательство. Онъ розсчитываетъ: если не уродится хлѣбъ, вытолчетъ его градъ, зальетъ вода, если погибнетъ отъ заразы мой скотъ, тогда мене спасаетъ доходъ изъ другого предпринимательства.

И наши сельскіи хозяева должны такъ поступати. Кромѣ управы земли, должны они думати о такихъ побочныхъ отрасляхъ сельского господарства, которыи-бы давали якій такій доходъ и служили источникомъ для заспокоенія голода въ случаѣ стихійныхъ бѣдствій, уничтожающихъ земныи плоды.

Годовля кроликовъ, козъ — можетъ подати средства для заспокенія голода въ случаѣ нужды. Такимъ же, но еще прибыльнѣйшимъ источникомъ для умноженія дохода изъ сельского господарства есть годовля живности (по польски дробю), къ которой принадлежатъ куры, гуси, утки (качки), индики и т. п. Особенно годовля куръ можетъ причинитись къ побольшенью дохода изъ господарства, ибо яйца курки не только можно употребити въ пищу, но и продати, куры же не потребуютъ много труда и

ухода за собою. Можно изъ нихъ выручити гроши на уплату податковъ и на заспокоенье домашнихъ потребностей.

Однако, щобы такая домашняя птица дѣйствительно давала доходъ въ господарствѣ, треба умѣти съ нею обращатись — знати, якихъ куръ и якъ ихъ держати, кормити, якого рода птицы держати. Потому въ поученіе нашимъ сельскимъ господарямъ издаемъ ту книжку — пока о курахъ, зачѣмъ послѣдуютъ также книжки о гусяхъ, уткахъ (качкахъ). Въ ней мы головное вниманіе обращаемъ на яйца — ибо яйца отъ куръ въ нынѣшнее время составляютъ найважнѣйшую статью въ доходѣ изъ домашней птицы.

У насъ по селамъ держатъ куръ не лучшихъ породъ, розличной величины, розличного оперенья и розличныхъ внѣшнихъ примѣтъ. Есть у насъ куры великіи и малыи, чубатыи и безъ чуба, съ бородою и безъ ней, съ ногами оперенными и гладкими, высокими и низкими; гребень у нихъ одинокій, розовидный, малый или большій. Хотя они отпорны на нашъ суровый климатъ, сами собѣ шукаютъ корма, добрыми суть квоками и старательно ведутъ цыплята, но продукція яецъ у нихъ меньшая, якъ у куръ другихъ заграничныхъ породъ и мясо ихъ не особенное. Отъ того и доходъ изъ нихъ меньшій. Потому треба породу нашихъ краевыхъ куръ поправити, т. е. сдѣлати то, що дѣлается съ овочевыми деревами, которыи искусственно прививкою (щепленьемъ) можно такъ улучшити, що они дадутъ вкуснѣйшіи и обильнѣйшіи плоды.

Въ той книжечцѣ мы подаемъ на передъ лучшіи породы куръ, роспространеніе которыхъ могло-бы подняти доходы нашихъ сельскихъ господинь. Тѣ породы, не только сохраняемыи въ ихъ чистотѣ, но и смѣшанныи съ нашими краевыми курами, принеслибъ пользу въ нашомъ сельскомъ господарствѣ.

На що годуютъ куры?

Годовля курокъ имѣетъ цѣлью или щобы получити отъ нихъ побольше яецъ, или щобы ихъ выкормити на мясо. Сверхъ того есть такіи люди, которыи, держачи и кормячи курокъ, стараются черезъ скрещиванье и улучшеннымъ кормомъ вытворити лучшіи расы (породы) сей птицы и ихъ сбывати тѣмъ, которыи хотятъ мати лучшую, по русски кажется — племенную птицу. Есть и такіи, которыи любятъ держати курокъ изъ аматорства, т. е. для своей пріятности, но такихъ у насъ мало — и такіи, которыи годуютъ когутôвъ для боя, ибо у нѣкоторыхъ народôвъ есть любимымъ розвлеченьемъ, придивлятись борьбѣ когутôвъ.

У насъ годуютъ курокъ для дохода, который выручается изъ продажи яецъ, молодыхъ курятъ и старшихъ куръ на мясо. Не каждая курка есть одинаково пригодная на яйца и на мясо. Обыкновенно тѣ, которыи больше несутся, даютъ меньше мяса, тѣ же, щó даютъ больше мяса, гôрьше несутся. Для того при выборѣ породы курокъ треба уважати на цѣль, якáя маетъ достигнутись.

Породы куръ на яйця.

Найлучше несутся курки въ теплѣйшихъ краяхъ надъ Середземнымъ моремъ, для того стараются ихъ росплодити и у насъ. Трудность заходитъ та, що они привыкли до теплѣйшого климата и нашой суровой зимы не выносятъ. Отже треба ихъ акклиматизовати, т. е. такъ ихъ держати и такъ старательно коло нихъ ходити, абы они у насъ могли перезимовати. Ихъ потомство уже легче переноситъ нашъ климатъ. Изъ тѣхъ южныхъ (полудневыхъ) расъ у насъ уже суть роспространены:

Леггорны.

Куры ливорненскіи, зовимыи также итальянскими, съ нѣмецка Лег-

горнъ, величины такой, якъ наши краевыи, несутъ уже въ шестомъ мѣсяцѣ яйца вагою 55—60 грамôвъ и даютъ въ годъ 170—250 яецъ. Они потребуютъ пространного подворья, подлѣтаютъ высоко и переносятся на чужіи загороды. На яйцяхъ квока ихъ неохотно сидятъ и для того всегда для высиживанья ихъ яецъ треба употребляти другіи квоки. Мяса даютъ меньше и оно середней якости.

Ихъ можно достати нынѣ и у насъ въ Галичинѣ уже зааклиматизованныхъ, но все таки они склонны до перестуды. У нихъ есть за великіи гребени, которыи имъ заваджаютъ въ шуканью корма. Зимою въ часѣ морозôвъ треба ихъ держати въ теплыхъ курникахъ.

Много есть видоизмѣненій той расы: бурыи, бѣлыи, чорныи, половыи, бѣлыи червоноплечіи. Изъ нихъ лучшіи бурыи, бѣлыи и половыи. Бѣлыи несутъ бôльшіи яйца, якъ бурыи, и при томъ они тужшіи.

Одинъ когутъ потребный — на маломъ подвôрьѣ — для 6—8 курокъ, — при бôльшôмъ подвôрьѣ на 8—12 курокъ — на пространномъ зеленôмъ подвôрью выстарчитъ одинъ когутъ и на 15 курокъ.

Птицеводы держатъ найрадше бѣлыхъ и половыхъ леггорнôвъ. Они меньше подвержены болѣзнямъ и хотя ихъ яйца не такъ велики, якъ яйца минорки, но за то гребень ихъ въ время морозôвъ не такъ быстро отморожуеся, якъ гребень минорки.

Якъ познати курку леггорнъ? — Голова должна быти съ одиночнымъ гребнемъ, сваливающимся на одну сторону и ровно вырѣзаннымъ. У половыхъ и бѣлыхъ птицъ клювъ (дзюбъ) долженъ быти жолтого цвѣта, у бурыхъ доволно темного, рожевого цвѣта. У всѣхъ должно быти красное (червоное) лице и бѣлая ушная мочка (конецъ ушка). Хвôстъ долженъ быти довольно высоко поднятый, ноги короткіи и небôльшое плотное тѣло. Голова когута того-же рода, якъ у курки, но гребень бôльше выпрямленный и съ ширшими вырѣзами. Опереніе бѣлыхъ птицъ должно быти чисто бѣлое, у бурыхъ и половыхъ тоже долженъ быти чистый цвѣтъ. У всѣхъ леггорновъ должны быти жолтыи ноги и черыре пальцы на каждой лапѣ

Минорки.

Минорки належатъ также до найноснѣйшихъ курокъ. Они превосходны для содержанія въ ограниченныхъ помѣщеніяхъ и для того ихъ найохотнѣйше держатъ въ городахъ и густо заселенныхъ мѣстностяхъ. Ихъ яйца суть дуже красныи и бôльшіи, якъ яйца другихъ породъ. Курочки, начинающіи кладку въ возрастѣ отъ четырехъ до пяти мѣсяцевъ отъ рожденія не даютъ такихъ великихъ яецъ, якъ молодки, начавшіи кладку въ шести - или осьми - мѣсячномъ возрастѣ. Яйца ихъ важатъ 60—80 грамôвъ. Они несутся также зимою, если маютъ теплыи и чисто содерживаемыи курники. Хоронити ихъ треба отъ морозôвъ, ибо легко отморожаютъ гребени. Одна курка несетъ годично около 260 яецъ.

Минорки неохотно квочатся, для того до высиживанья цыплятъ треба употребляти другихъ курокъ.

Ихъ мясо бѣлое, похожое вкусомъ и цвѣтомъ на мясо индика, но не сочное. Ихъ вага отъ $1^{8}/_{10}$—$2^{1}/_{4}$ килограма въ шести или въ семимѣсячномъ возрастѣ. Когуты бываютъ тяжшіи. Яйца отъ нихъ хороши для вывода цыплятъ.



Рис. 3

Они дуже живыи птицы и когда гуляютъ на свободѣ, копаются и шукаютъ робакôвъ; ту живость они сохраняютъ, если держится ихъ въ ограниченныхъ помѣщеніяхъ.

По чѣмъ познати курку-минорку? — Постава простая, хватская, грудь широкая. Цвѣтъ перья чорный или бѣлый. Пêрье чорныхъ минорокъ имѣетъ сильный глянцъ, въ особенности у когутôвъ. Гребень одиночный и дуже великій; у курокъ онъ сваливается на сторону, у когута онъ стоитъ прямо и имѣетъ правильныи вырѣзы. Лучшіи минорки должны хвостъ держати откинутымъ, то значитъ, не совсемъ просто. Ноги должны быти темныи, четыре пальцы на каждой нозѣ хорошо ростопыренныи и бѣлыи ушныи мочки безъ червоныхъ пятенъ. Чѣмъ простѣйше у когута стоитъ гребень, тѣмъ лучшои расы онъ. Ушныи мочки самца суть бôльшіи, якъ у курки, мигдаловой формы, а не округлыи, по возможности безъ морщинъ и мягкіи, якъ бѣлая скôрка рукавички. Если гребень у когута сваливается на сторону, то все таки онъ можетъ производити

лучшихъ курочекъ для кладки яецъ или для стола. Бѣлыи минорки не должны имѣти другихъ пѣрьевъ, кромѣ бѣлыхъ. Гребень, лице, ушныи мочки и сережки должны быти якъ у чорныхъ, ноги же бѣлого цвѣта. Птицеводы предпочитаютъ чорныхъ минорокъ.

Одинъ когутъ можетъ быти на 7—10 курокъ. Если подворье есть обширное, можетъ одинъ когутъ выстарчити на 12—15 курокъ.

Андалузки.

Та порода изъ Ишпаніи. Они превосходно несутся и даютъ великіи, бѣлыи яйца зимою, весною и лѣтомъ, однако ихъ треба хоронити отъ вліянія холодныхъ вѣтрôвъ. Цыплята розвиваются хорошо, при чѣмъ курочки ростутъ и опѣряются быстрѣйше, чѣмъ когутики. Курочки обыкновенно начинаютъ класти яйца въ возрастѣ отъ 5—6½ мѣсяцевъ. Одинъ когутъ приходится на 7—10 курокъ. Та порода произошла собственно отъ минорокъ.

Андалузокъ познается по ихъ оперенью, при которôмъ каждое перо имѣетъ кайму (рубецъ) темного оттѣнка. То оперенье можетъ быти бѣлое, чорное, синявое а иногда и пятнистое. Шійное перье есть темнѣйше отъ перья корпуса. У куръ той породы ушныи мочки суть бѣлыи, гребень одиночный свалившійся на сторону, ноги темно-синявыи съ четырьма пальцами на каждой лапѣ. У когута гребень стоитъ прямо и маетъ правильныи вырѣзы. Спина (хребетъ) тѣхъ птицъ есть темная, майже чорная, а грудь такого же цвѣта, якъ корпусъ курки.

Ихъ у насъ въ Галичинѣ труднѣйше получити.

Орпингтоны.

Та порода въ новѣйшое время выведена въ Англіи изъ скрещиванья другихъ лучшихъ по-

родъ. Орпингтоны несутся хорошо зимою и даютъ вкусное столовое мясо, при чѣмъ легко розводятся, даючи хорошо ростущихъ и быстро оперяющихся крѣпкихъ цыплятъ. Куры той породы также суть хорошими насѣдками и матерями и не доставляютъ такихъ клопотôвъ, якъ другіи яйценосныи породы.



Они не имѣютъ перья на ногахъ и покрыты красивымъ, чернымъ глянцеватымъ перомъ, почему и не загрязняются такъ, якъ другіи породы, розводимыи въ городахъ. Они переносятъ заключеніе и несутся, не смотря на самую суровую зимнюю погоду, даючи красивыи бурыи яйца. Тѣ яйца не великіи, но хорошихъ качествъ.

Въ молодомъ возрастѣ птицы тѣ быстро откормлюются. У когутиковъ часомъ являются въ гривѣ и поясницѣ перья ненадлежащого цвѣта, у цыплятъ же перя на ногахъ. Но такихъ въ выводку бываетъ не много.

Правдивыи орпингтоны должны имѣти полную грудь, червоное лице, чорныи не занадто долгіи ноги съ бѣлыми когтями, съ четырьмя пальцами на каждой лапѣ. Гребень курки есть одиночный, правильно вырѣзанный и безъ скла-

докъ. Чѣмъ бôльшій есть гребень, тѣмъ бôльшая носкость курки. У курки гребень иногда сваливается на сторону, у когута онъ всегда прямостоячій.

Если спаривается тѣ птицы, треба уважати, щобы самецъ всегда обладалъ розвитіемъ тѣхъ статей, которыхъ недостаетъ въ самкахъ. Такъ если курка имѣетъ дуже великій гребень, треба добрати для ней когута съ меньшимъ гребенемъ или же твердо сидящимъ на головѣ. Если у курки есть хорошая фигура, но за то недостатокъ въ яркости оперенія, то когутъ долженъ отличатися необыкновеннымъ глянцомъ перьевъ, хотя бы и тѣлосложеніе его не было безукоризненно.

Орпингтоны даютъ отъ 30—65 яецъ безъ перерыва и несутся черезъ всю зиму, въ морозную, сырую и грязную погоду. Курочки начинаютъ обыкновенно кладку въ шестимѣсячномъ возрастѣ, многіи въ пятимѣсячномъ. Тѣхъ птицъ легко можно розводити на сырыхъ и тяжкихъ почвахъ, при чѣмъ они зарôвно хорошо уживаются въ тѣсныхъ помѣщеніяхъ, якъ и въ просторахъ. Курки зимою даютъ дуже часто на 3 дни 2 яйца. Яйца имѣютъ 60—70 грамôвъ ваги. Вага курки пересѣчно $3^3/_4$ килограма, дорослого когута $4^3/_4$ килограма.

Понеже та порода бôльше роспространилася въ Англіи и другихъ краяхъ, то нынѣ есть кôлька отмѣнъ: 1) чорныи орпингтоны, яко найстаршая чистая порода съ чорнымъ перьемъ, чорными очами, чорнымъ клювомъ (дзюбомъ) и чорными ногами, 2) бѣлыи орпингтоны, тоншіи, съ высокими ясными ногами и яснымъ клювомъ; 3) жолтыи орпингтоны, съ смуглыми очами, бѣлыми ногами. Если у той породы попадаются бѣлыи пера или пера съ червоными каймами, то у такихъ птицъ есть уже свои недостатки; 4) Синіи орпингтоны сталево-синёго цвѣта съ червонымъ лицемъ, червоными звонками и великими темными очами. Цыплята у той породы суть пестрыи и прибираютъ свôй собственный цвѣтъ по утратѣ пуху. 5) золотыи орпингтоны цвѣта золотисто-смуглого, который у когутôвъ на го-

ловѣ, карку, шіи и сѣдлѣ переходитъ въ чисто —или червонявоняво золотый, на раменахъ въ малиновый цвѣтъ. 6) діаментовыи или порцеляновыи орпингтоны, съ французска — м и л ь ф л е р ы цвѣта жолтого, напоминающого ясно выправленную скóру. Каждое перо—за изъятіемъ крылъ и хвоста — имѣетъ въ концѣ очко, состоящое изъ круглой бѣлой крапинки, обведенной чорною полоскою. Пера въ хвостѣ суть чорныи съ бѣлыми и жолтыми тонкими пасмами. 7) чорно пестрыи орпингтоны (с п а н г л е д ы)— чорныи, накропленыи ровномѣрно бѣлыми знаками. Клювъ и ноги у нихъ бѣлыи, часто съ пятнами. Когуты, совсѣмъ подобныи до курокъ, имѣютъ часто червоныи пера на покрывахъ раменъ, шіѣ и въ сѣдлѣ.

Сессексы.

То англійскіи куры, у насъ еще не розведены. Въ Англіи ихъ дуже хвалятъ. Они начинаютъ нестися въ раннемъ возрастѣ и несутся долго, даючи въ рóкъ до 260 яецъ, ваги 60—70 грамóвъ. Ростутъ быстро и даютъ также вкусное мясо; вага когута 4—5 килограм., курки 3—4 килогр. Ихъ есть 3 отмѣны, изъ которыхъ самая извѣстная съ червоно-каштановатымъ упереньемъ, съ чорными перами въ крылахъ, чорнымъ хвостомъ, бѣлыми ногами, скóрою и клювомъ, червоною заушницею и звонками.

Итальянскіи гамбурскіи куры.

Произошли изъ скрещиванья итальянскихъ куръ съ гамбургскими, даютъ 240—270 яецъ въ годъ бѣлого цвѣта, но довольно малыхъ. Мясо ихъ доброго вкуса, но такъ якъ они невелики, то ихъ нерадо розводятъ.

Плимутъ - роки.

Давнѣйше плимутъ-роки уходили за лучшихъ куръ, но теперь меньше охотно ихъ держатъ. Уперенье ихъ подобное до кукушкиныхъ

кохинхинъ (см. стор. 21 и 22); каждое перо есть пепелято-сѣрое съ трехъ до четырехразовыми сѣро-чорными полосками. Клювъ короткій, жолтый, гребень простый, червоный, очи великіи, смуглочервоныи, ноги высокіи, жолтыи, неопереныи, хребетъ короткій и широкій.

Есть плимуты также чорныи, бѣлыи и половыи. Даютъ много мяса и несутся добре зимою. Они переносятъ тѣсное заключеніе и безъ вреда выдерживаютъ холодъ и сырость. Изъ куръ хорошіи насѣдки. Яйца ихъ бурыи.

Лучшіи для кладки яецъ суть итальянскіи плимутъ-роки, т. е. мѣшанная порода изъ курокъ плимутъ-рокъ и итальянскихъ когутовъ. При томъ дается одного итальянского когута на 7—9 курокъ. Лучшая того рода курка даетъ и 260 яецъ въ годъ. Они хорошо держатся и въ закрытыхъ дворахъ и на открытыхъ зеленыхъ лугахъ. Цыплятъ они могутъ выводити черезъ весь круглый годъ.

Мясо ихъ сочное, но имѣетъ желтоватый оттѣнокъ. Ихъ розводятъ бо́льше для яецъ.

Семиградскіи голошійки.

Только чашка у нихъ уперена; шія и голова голыи. Несутъ годично до 160 яецъ, ваги 60—70 грамо́въ. Въ Галичинѣ они еще мало извѣстны.

Гамбургскіи кохинхины.

Выведены изъ скрещиванья гамбургскихъ малыхъ куръ съ огромными кохинхинами и отличаются великой носкостію. Они кладутъ 200—230 яецъ въ годъ. Чѣмъ бо́льше они на свободѣ, тѣмъ лучше несутся.

Корпусъ и гру́дь у когута бурыи, испещреныи блестками; кончики каждого пера чорныи съ темно-зеленымъ отливомъ, хвостъ чорный, гребень розовидный. Курки такое самое имѣютъ опереніе и полосатую гриву. Въ Галичинѣ они еще не роспространены.

Курка есть немного меньшая.

Курки на мясо.

Знаменемъ куръ пригодныхъ для тученья на мясо есть: тонкіи кости, тяжшій корпусъ и спокойный темпераментъ, т. е слабшая рухливость. О розведеніи того рода птицъ стараются особенно французы. Головныи представители того рода птицъ есть:

Французскіи куры мясодайныи.

Есть то куры ла-флешъ, куры кревъкеръ, гуданы, фавролли, мехельскіибельгійскіи. Всѣ тѣ породы даютъ много вкусного мяса и хорошо несутся, но для нашого климата они мало придатны, ибо шкодитъ имъ зимно и мокрота. Ихъ могутъ держати только богатшіи люди, которыи старательнѣйше могутъ ними заниматися. По той причинѣ описаніе ихъ оставляемъ. О гуданахъ скажемъ низше.

Доркинги.

Есть то англійская порода куръ. Они не особенно хорошо несутся, если ихъ содерживати въ ограниченныхъ помѣщеніяхъ. Цыплята ихъ потребуютъ хорошого, открытого, заросшого короткою травою мѣстця для своихъ прогулокъ.

Доркинги могутъ быти темно-сѣрыи, серебристо-сѣрыи, зазулеватыи (кукушечныи), бѣлыи и червоныи. Червоныи мало цѣнятся. У куръ-доркингôвъ есть глубокій квадратный корпусъ, широкая грудь и короткіи бѣлыи ноги съ пятью пальцами на каждой лапѣ. У серебристо-сѣрыхъ, червоныхъ и темно-сѣрыхъ гребень есть одиночный съ правильно вырѣзанными зубцами — у бѣлыхъ и зазулевыхъ двойный или розовидный.

Темныи доркинги дуже великіи птицы. Когутъ важитъ 10 фунтôвъ — курка 7—8 фунтôвъ. Грудь и хвостъ когута чорного цвѣта. Грива и поясничничьи перья сѣрыи съ чорнымъ. Верхняя и нижняя части крыла сѣровато-бѣлого цвѣта,

тогда якъ поперечная полоса крыла чорного цвѣта.

Перья верхней части хребта курки должны быти весьма темныи; каждое перо имѣетъ свѣтло-бурую полосу въ центрѣ, грудь красновато-бурого оттѣнка; каждое перо кончится чорнымъ пятномъ. Хвостъ долженъ быти чорный, а перья и грива имѣютъ по сѣрому тлу чорную полосу въ центрѣ.

Серебристо-сѣрыи доркинги подобны по фигурѣ темнымъ, но не такъ велики. Опереніе когута такое же, якъ у темныхъ, но грива, поясничьи перья и плечевыи серебристо-бѣлого цвѣта, хвостъ и грудь чорныи. Хребетъ курки долженъ быти нѣжного (деликатного) блѣдо-сѣрого цвѣта, грудь свѣтло-бурого и блѣднѣйшая якъ голова, Грива, маючи чорныи и бѣлыи полосы, выдается блестящою.

Оба тѣ роды доркинговъ дуже роспространены.

Зазулеватыи доркинги суть меньшіи отъ темныхъ, но красныи. Каждое перо имѣетъ сѣровато-бѣлый цвѣтъ съ чорнымъ пятномъ на концѣ. Ихъ называютъ также пятнистыми доркингами.

Бѣлыи доркинги такой же величины, якъ и зазулеватыи, но маютъ высшіи ноги.

Мясо отъ доркинговъ самое лучшое и потому дорого за нихъ платятъ. Но они нуждаются въ отсвѣженіи крови, то значитъ, ихъ треба скрещивати съ другими лучшими породами, инакше и яйца и цыплята стаются все меньшими.

Лангшаны.

Та порода происходитъ изъ Китая и извѣстна въ Европѣ только 30 лѣтъ. Такъ якъ то великіи куры, ростущіи быстро, носкіи и выносящіи нашъ климатъ, то они уже есть и межи польскими селянами въ западной Галичинѣ. Мясо ихъ хорошое для стола, но ихъ не можно рѣзати раньше достиженія 6—8 мѣсячного возраста, такъ якъ до того времени они не успѣваютъ отложити на груди достаточное количество мяса. По достиженіи же сказанного возраста они уподобляются молодымъ индикамъ. Они кладутъ много бурыхъ яецъ, курки ихъ суть хорошими квоками и хорошо выводятъ цыплятъ. Ихъ можно держати въ заключеніи и если свободно ходятъ, сами собѣ пріискиваютъ пищу.



Опереніе ихъ имѣетъ прекрасный зеленовато-чорный глянцъ. Чорныхъ куръ легче розводити, якъ другого цвѣта. Хвостъ ихъ есть долшій, якъ у кокинхинокъ, ноги чорныи, оперенныи до внѣшнёго пальца; средній палецъ долженъ быти совершенно свободенъ отъ перьевъ. Долгіи ястре-

бинныи подколѣнки считаются недостаткомъ, въ особенности у когутовъ. Межи лангшанами есть довольно высокіи птицы, съ широкой грудной клѣткой, съ весьма прямо поставленнымъ корпусомъ. Гребень когута и курки долженъ быти правильно зазубленый и прямо поставленый. Не злыми суть также лангшаны съ свалившимся гребнемъ, но у всѣхъ должны быти червоныи ушныи мочки. На ногахъ часто встрѣчается нѣсколько бѣлыхъ перьевъ. Отъ такихъ птицъ не можно розводити нового поколѣнья. Они должны имѣти по четыре пальцы на каждой лапѣ.

На маломъ подвôрьѣ одинъ когутъ потребный на 7—8 курокъ, на пространномъ травястомъ подвôрьѣ одинъ когутъ выстарчитъ на 10—12 курокъ.

Цыплята выводятся съ чорнымъ пухомъ на хребетику и съ бѣловато-жолтымъ пухомъ на нижнихъ частяхъ тѣла и вокругъ головы.

Когуты доходятъ до 5 килограм., курки до $4^1/_2$ килогр. ваги. Мясо есть сочное, но не такъ вкусное, якъ французскихъ куръ. Курка несетъ яецъ въ среднемъ 130 въ годъ.

Куры господарскіи или на яйца и мясо.

Польскіи зелененожки.

Зелененожки суть нашею краевою породою, которую въ новѣйшое время птицеводы улучшили. Молодыи зелененожки съ мартового высѣда начинаютъ нестися раньше, а яйца ихъ суть тяжшіи отъ яецъ другихъ нашихъ куръ краевыхъ. Они выносливыи на холодъ, не подпадаютъ легко болѣзнямъ и довольствуются якимъ нибудь кормомъ. Курки суть добрыми квоками.

Примѣты ихъ: тѣлосложеніе больше-меньше четвероугольное, якъ у доркинговъ, ноги зеленыи, голова малая, стройная, лице червоне, по-

крыте дрóбными перцами, очи бронзовыи или червоныи, полныи, обведены червоною оправою, гребень малый, у когута простый, у курки гребень малый и легко сваленный на сторону, рѣдко коронообразный, стоячій. Грудь полная, широкая и обвислая, корпусъ (туловище) широкій, продолговатый, крыла довольно долгіи, пристаючíи, хвостъ у когута до горы поднесенный, сильно упеpенный съ перами долгими и серпообразно выгнутыми, у курокъ хвостъ въ гору поднесенный, меньше-бóльше широко роспятый. Шія короткая, крѣпкая и въ задъ немножко выгнутая. Клювъ рогового цвѣта, короткій сильный, закривленный. Звонки у курки малыи тонкіи, красно заокругленныи, у когута середней величины. Заушницы у курки малыи, продолговатыи, червоныи, у когута тоже червоныи, середней величины. Бѣлыи заушницы указуютъ уже на недостатокъ Ноги короткіи, у мóлодыхъ ясно-зеленыи, у старшихъ темно-зеленыи, неуперены съ нѣжною лускою.

Цвѣтъ упеpенья можетъ быти розличный: бѣлый, жолтый, червоный, подобный якъ у перепелицы, куропатки, фазана (бажанта), сѣроголового дрозда, зазули (кукушки), драхвы (дропи) — также другихъ видовъ пестрый, кропкованный. Найкраснѣйше выглядаютъ зелененожки-куропатки и кропкованы.

Зелененожка-куропатка имѣетъ золотавую шію съ чорными полосками, хребетъ сѣрый, грудь червоняво жолтавую, голову жолтую или темную, хвостъ темно-бронзовый. Когутъ долженъ имѣти грудь подбрюше и бедра чорныи, хвостъ чорный съ зеленавымъ проблескомъ, пера на шіи въ серединѣ чорно оттѣненны съ золотистою или порпуровою оправою, хребетъ порпуровый (ярко червоный), крыла каштановаты. Черезъ крыла должна ити чорняво-зелена насада металически блестящая и образующая широкій поясъ.

Зелененожки кропкованы (по польски siemieniaste) маютъ бѣлыи или чорныи головы и перье накропкованное, Нѣкоторыи маютъ только заднюю часть кропкованную, передъ же бѣлый.

Зелененожки-дрозды суть жолтыи съ чорными полосками.

Зелененожки-фазаны имѣютъ на червонной основѣ грудей чорныи пятна.

Зелененожки добре несутся. Яйце съ тонкой скорлупой, матовое, округлое, смачное, важитъ 55—60 грамовъ. Мясо сочное, напоминаетъ вкусомъ мясо дичи. Вага 2—3 лѣтней курки 4 килогр.

Зелененожки треба добре кормити, чисто держати курники и старатись, щобы тѣ курники зимою не были за зимныи и давати имъ чистую воду. Треба также старатись о раннѣйшомъ высѣдѣ — найпозше въ маѣ.

Польскіи незапоминайки.

Ту породу вывелъ польскій птицеводъ Владиславъ Фальковскій. Они тѣлосложеніемъ подобны до орпингтоновъ. Ноги у нихъ низкіи, гладкіи, синявого или зеленковатого цвѣта. Гребень малый, простый, часомъ рожичковый, заушницы бѣлыи, звонки червоныи.

Та порода куръ есть ноская и надается для годовли на мясо. Молодыи курки начинаютъ нестися уже въ ноябрѣ (листопадѣ) и кладутъ яйца до сентября (вересня) слѣдующого года.

Польскіи чубатки (хохлатки), падевки.

Найбольше извѣстны три розновидности той породы: золотисто-пятнистая, серебристо-пятнистая и чорная-бѣлохохлая (т. е. съ бѣлымъ чубомъ). У всѣхъ есть большій чубъ (хохолъ) а серебристо-пятнистыи и золотисто-пятнистыи имѣютъ бороду и баки. Ноги у нихъ синіи съ четырьмя пальцами на каждой. Они не велики.

У золотисто-пятнистого когута чубъ состоитъ изъ блестящихъ перьевъ, но съ теченіемъ времени, съ каждымъ послѣдующимъ линаніемъ перья дѣлаются бѣлыми и чорными. Грива и середина крыла часто бурого цвѣта. Хвостъ чорный съ бурою оторочкою. Грудь усѣяна пятнами. Курка

вся покрыта пятнистыми перьями, за исключеніемъ хвоста и нижнихъ частей крыла, которыи маютъ бурый цвѣтъ и оторочены чорнымъ цвѣтомъ.

Серебристо-пятнистыи куры имѣтъ совершенно такіи же примѣты, якъ и золотисто-пятнистыи, но вмѣсто бурого цвѣта опереніе ихъ имѣетъ бѣлое тло.

Когутъ и курка чорной и бѣлохохлої породы должны имѣти по всему тѣлу чорное опереніе, чубъ же чисто бѣлого цвѣта.

Изъ нихъ не добрыи квоки, но они прекрасно несутся и даютъ вкусное мясо. Яйца ихъ бѣлыи и середней величины.

Головный ихъ недостатокъ — то чубъ. Чубъ легко загрязняется и производитъ воспаленіе очей, отъ чого они тратятъ зрѣніе. Если курка попадаетъ подъ дождь, чубъ замокаетъ и залѣпляетъ ей очи. Для того они меньше надаются для сельского господарства.

Чубатыи куры другихъ породъ. Гуданы.

Чубы маютъ также другіи породы куръ — якъ бреда, ла-флешь, кревъ-керъ, турецкіи, голендерскіи, гуданы. Всѣ они для повысшой причины меньше придатны для нашихъ сельскихъ господарствъ.

Найбôльше роспространилися изъ чубатыхъ куръ гуданы съ причины своей носкости, хотя они зимою слабо несутся. Въ середнемъ курка-гуданъ даетъ 150 яецъ въ годъ 60—70 грамôвъ ваги. Ихъ легко у насъ аклиматизовати. Единственнымъ недостаткомъ есть ихъ чубъ, заслоняющій имъ очи и выставляющій ихъ на опасности отъ розличныхъ шкодникôвъ. Имъ вредитъ также мокрота. Чубы треба имъ старательно чистити.

Примѣты когута-гудана: тѣло середне великое, полное, грудь полная, ноги короткіи крѣпкіи, гладкіи съ пятью пальцами, бɔрода полная и баки, на головѣ круглый чубъ. Клювъ сильный, легко загнутый, темно сѣрый, гребень состоитъ

изъ двохъ лоскуктовъ, розвернутыхъ въ право и лѣво на подобіе листкôвъ роскрытой книжки. Звонки досыть долгіи, заушницы малыи, бѣлавыи, хвôстъ долгій съ долгими серповками. Вага $3^1/_2-4$ килогр., высота 55 центиметровъ.

Курка есть не много меньшая, однако выглядаетъ полнѣйше, чѣмъ когутъ. Гребень у ней меньшій, чубъ простый и округлый, состоящій изъ короткихъ, широкихъ перъ.

Касательно оперенья, то есть темныи и ясныи гуданы, смотря по тому, перемагаетъ-ли чорный цвѣтъ на перьяхъ, или бѣлыи пятна на немъ.

Гуданы надаются до скрещиванья съ другими породами.

Кохинхины.

Ихъ познати по короткихъ, жолтыхъ, оперенныхъ до кончика среднёго пальца ногахъ съ четырьмя пальцами на каждой. Гребень одиночный,

довольно короткій и прямо поставленный. Грудь широкая. Ляжки (уда) обильно снабжены пушистыми перьями, которыи незамѣтно сливаются

съ перьями ногъ. Цвѣтъ половый (бѣлаво-жолтый), бѣлый, куропатчиный, иногда чорный и кукушечный (якъ зазули). Найлучшими считаются кохинхины полового и куропатчиного цвѣта.

Полевыи кохинхины розличаются по оттѣнкамъ: у однихъ цвѣтъ блѣдно-цитриновый, у другихъ темнѣйшій. Перья когута гланцоваты, буро-червоны на хребтѣ и на плечахъ.



У куропатчиныхъ кохинхинъ на шіѣ перья чорныи съ бурымъ цвѣтомъ. Когутъ на груди и на нижнихъ частяхъ тѣла чорный, на хребтѣ и крылахъ червоный.

Тѣхъ куръ любятъ въ Англіи и употребляютъ ихъ до скрещиванья съ другими породами. Но у насъ, въ Галичинѣ, ихъ не рекомендуютъ, ибо они мало носкіи, даютъ малыи яйца, имѣютъ грубыи кости и обжорливыи — хотя съ другой стороны они даютъ много мяса.

Мехельскіи кукушки.

Даютъ много мяса и надаютса до тученья. Ихъ спроважали также изъ Бельгіи до Галичины, но они не выносятъ нашого климата, и для того ихъ тутъ не описуемъ.

Червоныи куры испандскіи.

Они происходятъ изъ Америки и ихъ захвалюютъ. Цыплята ихъ ростутъ быстро, однако медленно операются и для того до шести недѣль треба хоронити передъ слотою и острымъ воздухомъ. Когда оперятся, они стаются отпорными на болѣзни и хорошо переносятъ слоту и наглыи перемѣны воздуха. Тучатся легко и скоро. Оставленныи на свободѣ отходятъ далеко отъ дома, шукаючи корма, и вертаютъ вечеромъ сытыи. Несутся зимою и лѣтомъ. Вага когута до 4 килогр., курки до 3 килогр. Смуглыи ихъ яйца важатъ 60—70 грамôвъ.

Примѣты: долгій простый хребетъ, полная грудь, блестящій червоный цвѣтъ, становящійся на хребтѣ темнѣйшимъ.

Ваендоты. (Віандоты).

То новѣйшая американская порода, выведенная черезъ скрещиванье другихъ породъ. Есть три отмѣны той породы: серебристая, бѣлая и золотистая. Они хорошо несутся, кладутъ бурыи яйца и даютъ вкусное мясо. Они низки на ногахъ, полны въ груди, имѣютъ жолтую кожу.

Курка вся покрыта окаймленными перьями, но грудь и хребетъ бѣлыми и чорными. Когутъ и курка должны имѣти розовидный гребень, довольно маленькій съ мыскомъ, загибающимся внизъ, паралельно къ линіи направленія шіи. Лице и ушныи мочки червоныи. Клювъ темно роговатого цвѣта съ жолтыми полосами; нѣкоторыи віандоты имѣютъ жолтый клювъ. Ноги блестящого жолтого цвѣта, свободныи отъ оперенья, съ четырьмя пальцами на каждой лапѣ. Хвостъ долженъ быти чорный. Хребетъ и крыла серебристобѣлого цвѣта слегка окаймленного чорнымъ. Поясничныи и шійныи перья бѣлыи съ чорными полосами.

Золотистыи віандоты успѣшно несутся зимою и кладутъ довольно великіи бурыи яйца.

Признаки ихъ: у когута розовидный гребень съ мыскомъ въ задней части, оберненнымъ къ низу, клювъ темно-рогового или желтого цвѣта,



короткій, загнутый, очи орѣхового цвѣта, лице и ушныи мочки червоныи, грива полная стелющаяся по плечамъ. Опереніе золотистое, окаймленное чорнымъ цвѣтомъ. Плечи и середина крыла густого червоного цвѣта — летательныи перья бурыи, съ чорною каймою. Нижшіи части крыла чорныи. Конецъ крыла долженъ имѣти два ряды бурыхъ и чорныхъ пятенъ. Ноги жолтыи съ 4 пальцами на каждой. Курки маютъ грудь широкую, ноги дуже короткіи, жолтыи, на каждой лапѣ 4 пальцы, лице червоное, клювъ темно-роговый съ жолтыми полосами, гребень маленькій и низкій розовидный, крѣпко сидящій на головѣ.

Брамапутры.

Есть-то порода азіатская. Когутъ доходитъ до 70—73 центим. высоты и можетъ важити до 7 килогр. Курки заднюю часть тѣла маютъ полно и богато оперенную, ноги низшіи, шію коротшую и выглядаютъ присадковатыми. Брамапутры могутъ быти бѣлыи и темныи съ серебристо-бѣлымъ опереньемъ.

Брамапутры старшіи несутъ яйца до 85 грам. ваги червоножолтого цвѣта; яйца молодшихъ важатъ 55—65 грам.

Птицеводы совѣтуютъ нашимъ селянамъ брамапутры держати близко городовъ, где ихъ можно легко продати на мясо. Дальше отъ городовъ совѣтуютъ, вмѣсто брамапутра, держати лангшановъ.

Признаки ихъ: ноги жолтыи, короткіи, хорошо оперенный до кончика середнёго пальца. Гребень маленькій, состоящій изъ 3 маленькихъ гребешкôвъ, изъ которыхъ середній бôльшій отъ остальныхъ. У бѣлого когута-брамапутры опереніе бѣлое, за изъятіемъ перьевъ гривы, которыи имѣютъ полосы сѣрого или чорного цвѣта, и за изъятіемъ хвостовыхъ перьевъ, которыи чорныи и слабо окаймленны на бѣло. Курка тоже вся бѣла, только хвостъ у ней чорный и грива бѣла съ чорнымъ.

Темный когутъ - брамапутра маетъ грудь, хвостъ, ноги и нижніи части тѣла чорно оперены. Верхняя часть крылъ есть сѣровато - бѣлого цвѣта, каждое перо въ центрѣ чорное, нижняя часть крыла бѣлая, каждое перо кончится чорнымъ пятномъ. Грива, хребетъ и поясничіи пера сѣровато-бѣлого цвѣта съ чорнымъ. Грива курки состоитъ изъ чорныхъ перьевъ съ серебристо-бѣлой оторочкой. Корпусъ покрытый перьями, испещренными тонкими полосками. Такъ выглядаютъ и перья хвоста.

Куры для забавы (боевыи).

Уже въ давныхъ временахъ розвлеченіемъ для нѣкоторыхъ народовъ было приглядатися борьбѣ когутôвъ, для которой ихъ особно дресовали (пріучали). Нынѣ того рода забавы устроюютъ въ Англіи, въ Индіяхъ, Мексику, Перувіи и на островахъ Филипинскихъ въ Азіи. Для той цѣли были выведены особыи породы, изъ которыхъ важнѣйшіи: норманы или бельгійскіи куры боевыи, бантамы боевыи, бантамы японскіи. Не можно собѣ желати,

абы того рода забавы роспространилися и у насъ, и для того описаніе тѣхъ куръ пропускаемъ.

Розводятъ также особныи роды куръ для простой пріятности, якъ куръ-негритокъ (муринокъ), совсѣмъ чорныхъ съ невкуснымъ мясомъ, шолковыхъ японокъ съ шолковистымъ перьемъ и мясомъ тоже невкуснымъ, шолковыхъ сіямокъ, фризованныхъ перскихъ и т. п. Изъ нихъ, шолковыхъ японокъ можно употребити до высиживанья яецъ фазанôвъ (бажантовъ), перепелицъ и куропатокъ.

Курятники.

Въ помѣщеніи куръ желательно соединеніе слѣдующихъ условій: сухость воздуха, чистота, достаточность свѣтла а въ зимное время и тепла. Всѣ птицы въ сравненіи съ своей величиной потребуютъ при отдыханіи больше кислорода*), чѣмъ звѣрята и люди. Куры при отдыханіи выдѣляютъ отвѣтное количество углекислоты, который-то газъ занечищаетъ воздухъ и вредитъ здоровью всѣхъ животныхъ. Потому въ каждомъ курнику должна быти вентилація, щобы воздухъ отсвѣжался. Если того нѣтъ и куръ держится въ занечищенномъ воздуху, то они плохо несутся. Особенно треба уважати на то зимою, когда куръ держится запертыхъ. Треба старательно выметати куриный калъ, дающій впрочемъ хорошій навозъ. Калъ выдѣляетъ скоро много углекислоты, а такъ якъ до того причиняются еще нездоровыи испаренія птицъ, то отъ того терпитъ птица и подвергается болѣзнямъ. Для того зимою курники треба провѣтровати, избѣгаючи однако сильныхъ провѣвôвъ, которыи также вредятъ курамъ. Птицоводы совѣтуютъ, абы въ погодныи дни зимою курникъ оставляти одну годину открытымъ.

---

*) Воздухъ состоитъ изъ двохъ газôвъ: кислерода (около 21%) и около 79% азота.

Желательно есть, абы зимою, когда птицы рѣдко выходятъ на воздухъ, въ отдѣльномъ помѣщеніи на одну курку приходилось не меньше 30 квадратныхъ дециметровъ поверхности подлоги, иначе курамъ будетъ тѣсно.

Самое лучшое указаніе, якъ устроивати курники, пригодное для нашихъ краевыхъ отношеній, есть въ недавно вышедшой польской книжцѣ: „Józef Victorini, sekretarz administracyjny krajowego towarzystwa chowu drobiu we Lwowie. Hodowla drobiu Lwów 1910“, которую рекомендуемъ нашимъ читателямъ.

Викторини подаетъ такіи рады:

„Фронтовая стѣна курника должна быти обернена къ югу (полудню) или къ юговостоку. Желательнымъ есть, щобы курникъ прикасался отъ сѣвера (полночи) или сѣверозапада до другого будынка. Курникъ можетъ быти изъ дерева, прусской стѣны и цеглы“.

„Если курникъ долженъ быти изъ дерева, то треба дати двѣ стѣнки въ отступахъ отъ себе и отступы заполнити пепеломъ, или сѣчкою, или торфомъ, или опилками, ибо одна стѣнка не хоронитъ зимою отъ мороза. Где дерево дорожшое, тамъ лучше курникъ строити изъ пруской стѣны или цеглы“.

„Стелю (потолокъ) найлучше сдѣлати изъ около 3 центиметровъ грубыхъ досокъ плотно сбитыхъ, съ верху покрытыхъ слоемъ глины. Дахъ изъ дахôвки или бляхи цинковой, или изъ асфальтовой папы или руберроида. Если стѣны изъ дерева, треба ихъ гладко обстругати. Потолокъ и стѣны треба часто вапномъ бѣлити. Подлогу (полъ) треба дати отлогу (похилу) къ выходу, поднести по-надъ грунтъ и уважати, щобы была всегда сухою. Найлучше робити подлогу изъ цемента, асфальта, каменя, убитой глины, цеглы или тертицъ. Треба еѣ высыповати пескомъ, чистымъ или смѣшаннымъ съ пепеломъ или торфовымъ порошкомъ, въ зимѣ же выстелити соломою. Высота курника должна составляти найменьше 1 метръ 80 центримовъ до 2 метровъ. Що до пространства, то выше сказано, що на одну курку треба 25—30 дециметровъ подлоги“.

Другіи птицеводы радятъ подлогу вымостити цеглою, ибо она не втягаетъ въ себе мокрыхъ частицъ помета (кала) куръ, мало грязнится и черезъ таку подлогу не могутъ забратись въ курятники вороги куръ, якъ коты, щуры и тхори (хорьки). Если цегла за дорога, то можно намѣсити глины съ дрѣбно рѣзанною соломою, добре убити и посыпати битымъ щебнемъ (грузомъ изъ цегли) и грубымъ пескомъ. Якъ така подлога высхнетъ, то стается дуже крѣпкою и недоступною для щурôвъ и тхорей. Можно также робити подлогу изъ грубшихъ просмоленыхъ досокъ или полубрусовъ, плотно въ закрой сбитыхъ.

Банты треба отдѣльно ставити для каждой птицы около 20 центиметрôвъ долгіи и отдаленныи отъ себе по крайней мѣрѣ на 40 центиметрôвъ. Банта не повинна прилягати до стѣны, но отъ ней отстояти также на якихъ 40 центиметрôвъ. Куры должны отдѣльно на бантахъ быти, абы себе непотручовали и не грязнили. Робити тѣ банты треба изъ нестружениыхъ досокъ, затѣмъ шереховатыхъ, $3^1/_2$—7 центиметрôвъ грубыхъ примѣнительно къ вазѣ куръ Тяжшіи породы потребуютъ грубшихъ бантъ.

Банты повинны — при тяжшихъ курахъ уставлены быти 35—50 центиметрôвъ надъ подлогою, при лекшихъ курахъ выше 75 центим. до 1 метра по-надъ подлогою. Треба тѣ банты хоронити отъ робацтва. Потому запускается ихъ теромъ или карболинеумомъ и чистится отъ насѣвшого кала. Добре ихъ время отъ времени полити свѣжо гашенымъ вапномъ. Щобы производити таку очистку, не прикрѣпляется ихъ, но закладается вольно на столбикахъ вбитыхъ въ землю или на желѣзныхъ штабахъ.

Гнѣзда для кладки яецъ помѣщается при стѣнѣ противъ дверей — куръ тяжкихъ породъ на подлозѣ, для лекшихъ высше. Гнѣздо найлучше робити въ формѣ простыхъ деревянныхъ пуделъ 40 центим. высокихъ и 35 центим широкихъ, тоже 35 центим. долгихъ. Такое гнѣздо выбѣлити свѣжимъ вапномъ, выстелити сѣномъ или короткою соломою. Добре есть также высыпати

пепеломъ изъ дерева, сѣрчанымъ цвѣтомъ или порошкомъ противъ насѣкомыхъ.

Всѣ деревяныи части въ курнику треба кôлька разôвъ въ року хорошо вычистити, т. е. оскробати и вышуровати горячимъ лугомъ и высмаровати теромъ или растворомъ креолины или карболя. Калъ и смѣтье треба чаще выметати.

Желательнымъ есть, абы въ случаѣ непогоды куры не потребовали хоронитися до курникôвъ, но мали мѣстце на воздусѣ подъ дахомъ. Въ селахъ есть того рода шопы для возôвъ и орудій господарскихъ, куда куры убѣгаютъ передъ слотою. Въ мѣстахъ при курникахъ ставятъ нарочно такіи дахомъ крытыи убѣжища.

На подвôрью, коло курника, или коло шопы треба дати купу песку или пепелу, абы куры могли свободно въ ней вывалятися.

Въ теплѣйшіи поры года куры пребываютъ майже цѣлый день на воздусѣ и курятникъ имъ служитъ только для ночлега. Инакше зимою — тогда курятникъ есть постояннымъ ихъ жилищемъ. Щобы поддержати теплоту въ такихъ птичникахъ, треба помѣщати въ нихъ бôльше птицъ, но въ тоже время позаботитись о доставленіи имъ свѣжого воздуха. Лучше всего устроити коло курятника шопку, куда птицъ можно выпускати въ теплѣйшіи дни.

Птицеводы, которыи въ нашôмъ суровôмъ климатѣ, хотятъ раньше выводити цыплятъ, устроюютъ курятники съ печами для ихъ отопленья. Если весна поздна, холодна, сыра и дождлива, цыплята гибнутъ въ значительномъ количествѣ. Вотъ и для той причины ставятъ курятники съ печами. Такій птичникъ имѣетъ въ серединѣ печь, въ округъ которой идетъ узкій коридоръ, а изъ того коридора идутъ двери въ маленькіи отдѣленія, сдѣланныи проволочными сѣтками. Для лучшого освѣженія воздуха въ такомъ курятнику надъ крышей (дахомъ) есть куполъ, служащій за вентиляторъ. Тотъ вентиляторъ закрывается внутри снизу особными задвижками. Въ теплую погоду для пропуска воздуха задвижки тѣ открываются.

Въ каждомъ курятнику желательно имѣти окна, щобы доставити птицамъ необходимое свѣтло и чистый воздухъ. Окна должны быти выше бантъ на $^3/_4$—1 метръ. Тѣ окна должны имѣти подъемныи оконницы, щобы въ случаѣ потребы закрыти ихъ — сверхъ того проволочныи рѣшетки, которыи бы хоронили стекло отъ розбитья птицею хотѣвшою вылетѣти. Окна треба помѣщати отъ южной стороны. На ночь окна треба закрывати оконницами. Опытъ показалъ, що курки, держимыи въ такихъ освѣтленныхъ курятникахъ начиналися 6 недѣль раньше нести, чѣмъ курки держимыи въ курятникахъ недостаточно освѣтленныхъ.

Кто не можетъ выставити курятника на зиму съ печею, тотъ можетъ его сооружити изъ досокъ, выбити ихъ отъ середины папою даховою, и на ту папу дати опять доски, которыи на смычкахъ (фугахъ) треба обити листвами.

Куры, держимыи въ нечистомъ помѣщеніи, кромѣ розличныхъ болѣзней, достаютъ часто воши, которыи высосываютъ ихъ соки. Такіи курки зимою не несутся.

Викторини въ своемъ выше названномъ сочиненіи препоручаетъ на зиму земляныи курники, устройство которыхъ есть простое и недорогое и при томъ обезпечаетъ зимою курамъ достаточное тепло. Вязанье земного курника, на 1 метр. 8 дециметрôвъ высокое и такъ же широкое, обивается досками и покрывается даховою папою. Можно также доски засмаровати теромъ и густо посыпати пескомъ или цементомъ, щобы крышу сдѣлати непроницаемою и прочною. Крышу покрывается слоемъ муравы на 20 центим. толщины. Мураву вырѣзуется съ сѣножати въ четвероугольныхъ 30 цнтметр. долгихъ кускикахъ, которыи укладается одинъ коло другого и убивается. Мураву треба класти весною, абы кусники срослися и образовали одноцѣльную поверхность, которой дождь уже не повредитъ.

Устройство гнѣздъ для насиживанья.

Гнѣзда должны быти непремѣнно удобны, иначе курки несутъ яйца, где прійдется: въ шопахъ, стайняхъ, корчахъ въ травѣ, причѣмъ много яецъ тратится, ибо ихъ поѣдаютъ щуры, свини, собаки и пр. Слѣдуетъ еще приняти въ вниманіе, що курка памятлива и где она снесла первое яйце, туда она будетъ старатись класти и остальныи, а потому и гнѣзда должно приготовлятись передъ началомъ носки яецъ.

Наши господини, щобы курки не губили яецъ, обыкновенно рано передъ кормленьемъ пробуютъ ощупываньемъ одну курку по другой и только такіи штуки выпускаютъ изъ курятника, у которыхъ не осязается яйца готового къ снесенью. Курокъ, имѣющихъ снести яйце, задержуется въ курятнику. Однако такій способъ соединенъ съ потерью и неразъ безъ потребы держится курку въ запертью и лишается еѣ свѣжого воздуха, потребного тоже для выдѣлки яецъ.

Найлучшимъ способомъ предохоронити курки отъ губленья яецъ есть — дати имъ здоровый курятникъ и въ немъ отвѣтно устроенныи гнѣзда, о которыхъ мы упомянули высше. Найлучшимъ гнѣздомъ есть всетаки пака (ящикъ) — гнѣзда сплетенныи изъ соломы не суть удобными, ибо въ нихъ заводятся розличныи насѣкомыи. Гнѣзда не можно прикрѣпляти къ стѣнѣ или подлозѣ, ибо треба время отъ времени его выносити для очистки.

Тутъ помѣщаемъ изображеніе гнѣзда-ящика.



Верхняя стѣнка есть покатая (похилая), щобы пометъ птицъ не задерживался — *д* — закраина, щобы птицы не вытащивали соломы и не выкатывали яецъ — *с* ручки для перенесенія гнѣзда — *а* — крышка на случай необходимости закрыти гнѣздо — *б* — отворы для прохода свѣжого воздуха въ гнѣздо — 32 и 40 ц. (центриметры) означаютъ розмѣры гнѣзда.

На рисунку 13 стор. 54 показано насѣстное гнѣздо, сдѣланное изъ ивовыхъ прутьевъ; гнѣздо то прикрѣпляется на гакахъ (крюкахъ) къ стѣнѣ.

Въ большихъ господарствахъ куриныхъ устроюютъ такіи гнѣзда, которыи сами запираются, коли курка влѣзетъ въ гнѣздо, такъ що его оставити не можетъ, поки не снесетъ яйце. По снесенью она кудкудачетъ и тогда еѣ выпускаютъ.

Кормленье и тученье куръ.

Въ селянскомъ господарствѣ можно домашней птицы, въ частности же куръ, держати стôлько, абы ея содерживанье и кормленье не было соединено съ большими издержками. Птицеводство у селянъ можетъ быти только побочною галузью господарства. Инакше имѣется дѣло у птицеводовъ близко великихъ мѣстъ, въ которыхъ и яйца и куры можно дорожше продати. Тутъ птицеводство мôжетъ для себе составити уже свой особный родъ господарства.

Если курка есть голодна, держится близко хаты и старается войти внутрь. Если она съѣла поданый ей кормъ, не оставивши остатковъ, и отойшла на гребанье, то есть знакомъ, що она получила кормъ въ отвѣтной скôлькости. Если она выбираетъ въ кормѣ, вышукуетъ зерна и оставляетъ часть корма не съѣженого, то знакомъ, що на другій разъ треба порцію уменьшити. Кормити треба вообще домашнюю птицу въ тыхъ самыхъ порахъ дня, ибо если того не дѣлается, то куры, вмѣсто розойтись и шукати робакôвъ, крутятся коло дома или курятника и ждутъ корма.

Если куры за мало получаютъ корма, то плохо несутся, но и если имъ давати за много корма, также перестаютъ нестися вслѣдствіе перекормленья (ожирѣнья).

Въ теплыи поры року куры на селѣ маютъ довольно способности гребати по дорогахъ, въ ровахъ, огородахъ, садахъ, на подворью, и находятъ досыть звѣриного корма въ насѣкомыхъ и всякого рода робацтва, такъ що потреба лише давати имъ зерна въ мѣру потребы.

Зимою треба ихъ кормити и тутъ добрымъ кормомъ есть вареныи картофли, смѣсенныи съ пшеничными отрубами и то въ тепломъ (не горячомъ) состояніи. Вообще теплая страва усиляетъ носкость куръ. Они лакомо пожираютъ варены и посѣканыи бураки, смѣшанныи съ послѣднёго сорта мукою, листье яринъ и молодой конюшины, зерна солнечника, всѣ отпадиши кухонныи изъ сырого и вареного мяса, ягоды, сѣмена розличныхъ ростеній, сыръ, солодкое, кислое молоко.

При кормленью куръ треба соблюдати слѣдующое: 1) кормъ давати мѣшанный, т. е. не только зерно, но и мягкій кормъ, т. е. зелень, парену конюшину, варены бураки, головки капусты, картофли; 2) кормъ всегда задавати свѣжій — не затхлый, не прокисшій и не зогнившій; 3) въ сухомъ видѣ не слѣдуетъ давати курамъ зеренъ въ смѣси, но отдѣльно, ибо курка выбираетъ, що для ней есть вкуснѣйшимъ и остальное оставляетъ недоѣденнымъ; 4) лѣтомъ, коли куры цѣлый день бѣгаютъ на дворѣ и сами находятъ много пищи, давати меньше корма на ночь; 5) если курка зимою, осенью и въ холодную весну держится въ курятнику, треба еѣ кормити два разы въ день, рано и вечеромъ; 6) зимою, когда холодно и когда курка линяетъ, дачу корма усилити; 7) коло курятника треба постоянно имѣти въ запасѣ немного вапна, хорошо отгашенного и смѣшанного съ пескомъ, ибо куры охотно клюютъ (дзюбаютъ) такое вапно и при томъ никогда не будутъ лити яецъ, т. е. сносити ихъ безъ скорлупы или ихъ росклевывати (роздзёбовати), що нерѣдко случается, если куры

не употребляютъ въ пищу вапна; 8) вода въ курятникахъ должна находитися постоянно, потому що куры утоляютъ свою жажду не одновременно, а постепенно, кôлька разôвъ въ день — воду перемѣняти по крайней мѣрѣ разъ въ день, употребляючи всегда свѣжой. Простыи куры зимою поѣдаютъ снѣгъ — но если курятники теплыи, то все же лучше ставити воду. 9) Важнымъ причинкомъ до корма есть меленыи кости; костяная мука помогаетъ росту домашнихъ птицъ и носкости куръ. (Для меленья костей есть особныи млынки).

Въ многихъ книжкахъ о куроводствѣ подается, якъ кормити куръ, якъ и щó имъ давати рано и вечеромъ и въ якихъ порціяхъ. Мы тѣхъ указаній тутъ не помѣщаемъ, ибо кормленіе куръ зависитъ отъ ихъ породы, хозяйственныхъ обстоятельствъ и климата. Тутъ рѣчею каждой господини есть, уважати, при якой скôлькости и якôмъ кормѣ куры добре ростутъ, тучатся и хорошо несутся. Практика мѣстцевая есть найлучшою учителькою. Курка меньшей величины потребуетъ корма меньше, большой величины больше. Въ теплое время потреба для ней также меньше корма, чѣмъ въ холодное. Тутъ можемъ навести только розличныи роды корма. Такими есть: ячмень, овесъ, кукуруза, пшеница, гречка, отрубы пшеничныи, картофли, мѣшанина изъ 1 килограма вареныхъ картофель, 1 кил. вареныхъ бураковъ, $^1/_2$ килогр. отрубъ и 1 литры сбиранного молока, меленыи кости, мучка изъ рыбъ, листье капусты, кусники бураковъ, грубо рѣзанная и запаренная сѣчка изъ сухой конюшины, мѣшанина кукурузы и овса (помогаетъ носкости яецъ).

Яко кормъ для куръ поручаютъ нынѣ сѣно изъ конюшины. Треба его добре срѣзати, дати до горшка, залити водою и варити ажь до розмягченья въ продолженіе цѣлой годины. Ту вареную конюшину мѣшаеся съ мукою или истолченымъ зерномъ, при чемъ на 2 литры сѣчки конюшиной дается 1 литру муки или толченого зерна. Такъ приготовленный кормъ дается доперва въ слѣдующій день, при чѣмъ треба ува-

жати, щобы былъ мокрый, ибо въ сухомъ состояніи неохотно его ѣдятъ куры. Такое кормленье препоручаютъ зимою изъ взгляда на его дешевость и на то, що отъ него куры жирѣютъ и добре несутся.

Для кормленья куръ господиня повинна употребляти всѣ отпадиши въ домашнемъ господарствѣ, которыи инакше даромъ марнуются, якъ всякіи кухонныи отпадыши, отпадыши отъ большихъ звѣрятъ домовыхъ, зерна павшй на землю при звоженью и молоченью снопо̂въ и т. д.

Для тученья найлучше выбраги молодшіи штуки, ибо старшіи не даютъ такъ смачного мяса. Курку или когута на тученье помѣщается отдѣльно въ такъ тѣсной клѣтцѣ, абы не могли въ ней свободно обертатись. Дно клѣтокъ повинно быти изъ отстоящихъ отъ себе листвей, абы калъ могъ выпадати изъ клѣтки. Клѣтку ставится въ темномъ мѣстцѣ, абы не допустити шума и крика, ибо птица найлучше тучится въ тиши. Окна треба заслонити, абы были сумерки въ такомъ мѣстцѣ. Найлучшимъ кормомъ есть грубо смеленый овесъ, гречка и послѣднёго сорта мука. Надмѣръ кукурузяной муки и мука гороховая не даютъ вкусного мяса.

Яко хорошій кормъ для тученья Викторини препоручаетъ: 1) 2 части овсяной муки, 2 части гречаной муки, 1 часть кукурузяной муки; 2) мѣшанку овсяной, ячменной и гречаной муки по ровнымъ частямъ; 2) части гречаной муки, 2 части муки послѣднёго сорта и 1 часть пшеничного грысу. Тѣ мѣшанки заробляется сбираннымъ или полнымъ молокомъ и додается немного кухонной соли. Вмѣсто молока до мѣшанки можно додати сырой зелени или мясного корма.

Въ клѣтцѣ куръ держится 24 дней. Съ начала дается меньшими порціями, но частѣйше — потомъ три разы въ день и по каждомъ кормленью треба сосудъ вычистити и верхъ дномъ обернути. Въ другомъ тыждни кормится птицу только 2 разы въ день, но такъ обильно, сколько можетъ съѣсти птица. Сосудъ каждый разъ треба вычистити и верхъ дномъ обернути. Въ

послѣднемъ тыждні тученья до корма прибавляется не много посѣканного быдлячого лою. На 1 штуку выстарчитъ 1 дека лою дневно. Въ послѣднихъ дняхъ тученья додается до корма немного смальцу и ароматичныхъ кореней, якъ анижу или кминка и дается до питья молоко.

Пока таку птицу всадити до клѣтки, треба еѣ осмотрѣти, нѣтъ-ли на ней вошей; если есть, засыпуется еѣ сѣрчанымъ цвѣтомъ — тоже повторяется на три дни передъ вынятьемъ еѣ изъ клѣтки на зарѣзанье или продажу.

Напихати курки рукою клюсками — задаетъ много труда и не ведетъ къ желаемой цѣли.

Вообще при кормленью куръ треба мати на увазѣ, що они потребуютъ также пищи звѣринной и минеральной. Куры на свободѣ пищу звѣриннную находятъ въ хрущахъ, гусеницахъ, робакахъ, дождевыхъ червяхъ — минеральную же пищу находятъ въ роскиненныхъ платкахъ тынку изъ стѣнъ, муссора, каменчикахъ, въ песку. Если же куры въ такихъ подворьяхъ, где того всего нѣтъ, треба имъ давати мясный и минеральный кормъ.

Въ такихъ случаяхъ препоручаютъ давати курамъ: 1) мясную мучку — препоручаютъ мучку Либига и мучку „Австрія“; 2) мучку изъ крови; 3) мучку изъ рыбъ худыхъ, сушеныхъ и смеленыхъ — розумѣется оно можетъ быти лише тамъ, где легко о рыбу и где она дешева; 4) костяную мучку (не можно ей однако за много давати).

Средствами побуждающими носкость куръ, особенно молодыхъ, есть имбиръ, перецъ, сѣмя анижу, сѣмя льну, мука изъ жолудей и кропива. Однако треба знати, що тѣ средства, хотя сначала у молодыхъ курокъ вызываютъ раннѣйшую носкость, однако производятъ слабости ихъ яйниковъ и такіи курки потомъ перестаютъ нестися. Що найбѣльше можно у насъ употребляти сѣмя льняное и кропиву.

Вылусканное и высушенное на печи сѣмя льняное парится горячою водою, а другого дня заробляется съ зерномъ збожевымъ и жолудевою мукою на тѣсто.

Щó до кропивы — то треба выбирати молодыи стебла, дробно посѣчи, скропити водою и посыпати кукурузяною или ячменною мукою.

Кропивы можно приготовити запасъ на зиму, сложивши еѣ н. пр. для сушки на чердаку. Передъ употребленіемъ треба еѣ запарити горячою водою.

Много болѣзней куръ происходитъ отъ злой воды - если курки утоляютъ свою жажду въ гноевкахъ, калужахъ, ровахъ Для того, кто кормитъ курей, долженъ въ кôлькохъ мѣстцяхъ подвôрья поставити сосуды съ чистою водою. Где есть на подворью колодязь (студня), тамъ обыкновенно идутъ курки къ колодязю, где всегда попадаются баюрки. Но вода тѣхъ баюрокъ можетъ имъ вредити — для того лучше коло такихъ колодязей также ставити сосуды съ водою. Воду въ тѣхъ сосудахъ лѣтомъ, въ время великой жары, треба нѣсколько разъ отсвѣжати, зимою же подавати курамъ только воду съ лѣтней температурой, т. е. отеплѣвшуюся въ комнатѣ.

О насиживанью и уходѣ за цыплятами.

Выборъ яецъ для насиживанья.

Для насиживанья годны только свѣжіи яйца и оплодотворенныи. Свѣжость яйца познается: 1) по виду, причѣмъ свѣжіи яйца имѣютъ чистую поверхность съ розоватымъ или жолтоватымъ отливомъ, а несвѣжіи — вытертую, якъ-бы лосняющуюся поверхность съ едва замѣтными свѣтло-синеватыми пятнышками (плямками ; 2) по вазѣ, ибо не свѣжое яйце, вслѣдствіе высыханія своего содержимого, становится все лекшимъ; 3) при помощи особныхъ приборовъ, которыи называютъ о в о с к о п а м и.

Самый простой овоскопъ показуетъ тутъ на рисунку.



Онъ состоитъ изъ прикрѣленного къ деревянной ручцѣ куска толстой (грубой) бумаги (паперу), въ которой продѣланъ отворъ, въ который вставляются другіи кусочки бумаги (2 и 3) съ прорѣзанными въ нихъ отворами въ формѣ яйца. Яйце приставляется къ отвору и наблюдатель черезъ яйце смотритъ на свѣчку, поставленную по другой сторонѣ картона. Если яйце свѣжое, то оно хорошо просвѣчиваетъ и въ центрѣ его видно жолтокъ. Яйце несвѣжое плохо просвѣчиваетъ, причѣмъ въ скорлупѣ видно много неровностей, синеватыхъ или жолтоватыхъ пятенъ, а въ верхнемъ тупомъ концѣ яйца видна бо̂льшая пустота. Опытныи господини обходятся и безъ того прибора, прикрываютъ яйце рукою, смотрятъ черезъ него на свѣтло и такъ опредѣляютъ степень свѣжости. Однако лучше мати хотя-бы оный простый приборъ, который каждый самъ собѣ можетъ сдѣлати. Есть и овоскопы съ металлическими пластинками и чаркой для вставленья яйца, съ чорнымъ сукномъ вокругъ отвора, плотно обхватывающимъ яйце и преграждающимъ доступъ свѣтла. Ихъ можно купити въ склепахъ.

Яйце оплодотворенное т. е. съ зародышемъ отъ неплодотворенного, т. е. безъ зародыша можно отличити только — при яйцахъ о скорлупѣ бѣлой дня 5-ого, при яйцахъ о скорлупѣ темной дня 7-ого по насаженью. Тогда розсматривается яйце способомъ выше обозначеннымъ посредствомъ овоскопа, или у кого доброе вправ-

ное око, и безъ него. Если яйце было оплодотворенное, то въ немъ зародышъ окажется въ видѣ темного пятнышка (плямки) съ росходящимися жилками, которое съ каждымъ днемъ все увеличивается и къ 11—13 дню якъ-бы заполнитъ собою все содержимое яйца, которое тогда уже совсѣмъ не будетъ просвѣчовати. Яйце безъ зародыша на 5—7 день насиживанья будетъ по прежнему одинаково прозрачное Для такой провѣрки насиживаемыхъ яецъ есть также особный овотропъ изъ бляхи или дерева съ зеркальцемъ внутри, въ которомъ отражается вверху вставленное яйце. Незаплодненныи яйца треба изъ гнѣзда усунути.

Причины неоплодотворенія яецъ есть: если одному самцу дано за много самокъ или если величина самокъ значительно рôзнилась отъ величины самца — коли самецъ есть за старый или за молодый - если курка была перекормлена и занадто ожирѣла (потолстѣла) — если курка въ время кладки находилась въ тѣсномъ и темномъ помѣщеніи.

Невѣрно есть, будьто зимой снесенныи яйца суть безплодны — если курка находится въ хорошихъ условіяхъ и гуляетъ съ когутомъ, то яйца и зимою будутъ съ зародышами и въ январѣ и февралѣ можно вывести цыплятъ.

Яйца, предназначенныи къ насиживаню, треба сохраняти въ холодномъ (6—12^0 по термометру Реомира), темномъ или слабо освѣщенномъ и сухомъ помѣщеніи. Можно сохраняти ихъ въ кошахъ или ящикахъ (коробахъ). Ящикъ треба провздолжными и поречными дощечками роздѣлити на малыи отдѣлы и въ каждый отдѣлъ особно вставити яйце. Птицеводы робятъ для храненія такихъ яецъ особныи комоды, въ которыхъ держатъ посортованныи яйца не только куръ, но и гусей, качокъ, индикôвъ.

Для насиживанья найлучше брати яйца 1—2-хъ недѣльныи, но и 3-хъ недѣльныи, хранимыи въ хорошихъ условіяхъ, могутъ быти пригодными.

Подъ насѣдку кладутъ столько яецъ, сколько она можетъ помѣстити подъ собою, прикрывши ихъ, а такъ якъ величина курокъ розлична,

то не можно опредѣлити числа закладываемыхъ подъ насѣдокъ яецъ. Въ середнемъ кладутъ подъ курку 13—15 яецъ; индичка можетъ высѣсти 21—23 курныхъ яецъ. Принято за правило давати нечетное число: 13, 15, 17 и т. д. яецъ, бо тогда яйца удобнѣйше роскладаются подъ насѣдкою (квокою).

Присмотръ за насѣдкой (квокой) въ время высиживанья.

Курка высиживаетъ цыплятъ 21 день — но бываютъ случаи, що оденъ день раньше или день-два позднѣйше. Въ такомъ самомъ часѣ высиживаетъ куриныи яйца и индичка. Индичку можно даже съ большей корыстію употребити за насѣдку (квоку), ибо подъ ню можно дати больше яецъ и она отлично водитъ вышедшихъ цыплятъ. Въ такомъ случаѣ однако на квоки треба брати молодыхъ индичокъ, ибо старыи часто топтаютъ дробненькіи куриныи цыплята.

Въ господарствѣ часто случается, що потребныи ранніи насѣдки а курка не росположена садитись на яйца. Въ такомъ случаѣ, щобы пріохотити курку сѣсти на яйца, употребляютъ такій способъ: въ гнѣздо поставленное въ тепломъ помѣщеніи кладутъ кôлька подкладôвъ, т. е. яецъ изъ крейды, гипса или мармора и въ такое гнѣздо запираютъ старую курку, уже выводившую цыплята. Два разы въ день курку выпускаютъ для корма, при чѣмъ кормъ дается найлу́чшій и въ бôльшôмъ количествѣ. По 3—4 дняхъ вмѣсто штучныхъ яецъ подкладаютъ настоящіи.

Если курка не въ свôй часъ садится на яйца, н. пр. въ концѣ лѣта, коли не желаютъ имѣти бôльше цыплятъ, то такихъ куръ запираютъ безъ корма на двѣ добы въ темное помѣщеніе, н. пр. въ пивницу (подвалъ), но щобы тамъ не было удобного, мягкого мѣстця для сидѣнья птицы. Можно также курку помѣстити въ свѣтломъ отдѣленіи разомъ съ добрымъ когутомъ, который скоро розгуляетъ курку.

О гнѣздахъ для насиживанья мы сказали высше въ уступѣ о курятникахъ. Гнѣзда такіи повинны быти не въ горячихъ, полутемныхъ помѣщеніяхъ. Если межи квоками попадаются такіи, що́ засѣдаютъ въ гнѣзда другихъ, то такихъ квокъ лучше сажати въ ящики съ крышкой и открывати крышку два разы въ день, щобы курка могла сойти съ гнѣзда для ѣды, для питья.

Случается, що квока соскакуетъ съ гнѣзда. Причиною того могутъ быти насѣкомыи. Тогда птицу и гнѣздо треба осмотрѣти, а если дѣйствительно есть насѣкомыи, старую солому выкинути изъ гнѣзда и замѣнити свѣжою, квоку же подъ крылами натерти перскимъ порошкомъ или порошкомъ изъ сухого листья полыни.

Добре есть въ помѣщеніяхъ, где есть квоки, держати кучу сухого песку съ прибавкою золы изъ печей; въ песку куры охотно купаются и стираютъ съ себе насѣкомыхъ.

Бываютъ квоки, которыи по ко́лька дней не сходятъ съ гнѣздъ; такихъ птицъ треба насильно снимати и подносити къ корму, инакше квока можетъ сдохнути съ голоду. Квока всегда въ запасѣ должна имѣти кормъ и воду.

Ревизію 5—7 дня для просмотра яецъ, о которой мы высше сказали, найлучше производити то гда, коли квока сошла съ гнѣзда или поздно вечеромъ, когда курка не такъ сильно пугается.

Уходъ за цыплятами (курятками).

Цыплята вылупляются сами безъ посторонней помощи; но иногда случается, що циплёнокъ (курятко) хотя и пробьетъ трещину въ скорлупѣ, но не можетъ росширити отвора и присыхаетъ своимъ пушкомъ въ яйцѣ, ослабѣваетъ и замираетъ въ немъ. Если то замѣтится, то треба осторожно иголкою росширити отворъ, прибиваючи скорлупу въ видѣ перстеня вокругъ, якъ-то обыкновенно продѣлываетъ самъ цыплёнокъ.

Цыплята, вылупившися, должны хорошенько обсохнути подъ квокою, послѣ чого ихъ осторожно вынимается изъ подъ ней и сажаетъ

въ ящикъ или кошикъ, наполненный пухомъ, прикрытымъ тряпочкою (шматиною), щобы онъ не могъ пристати къ цыплятамъ. Кошикъ съ цыплятами ставятъ въ теплое мѣстце на печи, лежанцѣ (припечку) и т. п.

Если вылупившихся цыплятъ не отдѣлити отъ квоки, то она легко можетъ придавити цыплёнка среди остающихся яецъ или же самъ цыплёнокъ можетъ вылѣзти и выпасти изъ гнѣзда, що́ заставляетъ курку безпокоитися и преждевременно оставляти гнѣздо.

По вылупленью всѣхъ цыплятъ гнѣздо вычищаютъ, перемѣняютъ въ немъ солому и посадивши туда квоку, подпускаютъ подъ ню цыплятъ.

Если цыплятъ высидѣли одновременно двѣ курки, но каждая не много, то всѣхъ цыплятъ можно подсадити подъ одну курку, другую же квоку треба подальше отсадити, щобы не лѣзла къ цыплятамъ и не безпокоила ихъ.

Если на куриныхъ яйцахъ сидѣла индичка, то подъ ню можно посадити 20—25 штукъ.

Подсаживанье цыплятъ дѣлается въ 1—3 дняхъ послѣ высиживанья; позже узнаетъ курка чужихъ цыплятъ и сердится на нихъ. Подсаживанье лучше совершати вечеромъ, когда птица спокойнѣйша.

Вылупившихся цыплятъ треба хоронити отъ холода и сырости. Въ первую недѣлю ихъ даже не выпускается на дворъ, хиба що есть теплая, сухая погода. На второй и третьей недѣлѣ цыплята выпускается только въ солнечныи дни и не раньше 8—9 часовъ утра, коли роса обсохнетъ. Въ холодныи и дождливыи дни не слѣдуетъ цыплятъ совсѣмъ выпускати. Если грозитъ дождь, треба ихъ загоняти въ сухое, закрытое помѣщеніе.

По шести недѣляхъ цыплята достаточно оперяются и тогда уже меньше имъ шкодитъ сырость и холодъ. Тогда они мало-по-малу отвыкаютъ отъ матери, на ночь сами взбираются на банты (нашести) и днемъ начинаютъ бѣгати особно отъ матери. Тогда треба ихъ оберегати отъ щуровъ, котовъ, ястребовъ и вороновъ

Противъ щурóвъ придастся въ курятнику лапка, противъ котóвъ охороняетъ добре собака. Ястребы и вороны боятся индичокъ и на цыплята при индичкахъ не нападаютъ. Курка водитъ цыплятъ 2—2½ мѣсяца, индичка 3—4 мѣсяцы.

Если цыплята племенныи (расовыи) и дорогихъ породъ, то препоручается для ихъ помѣщенья устроити ящикъ (скринку) на 2 метры долгій $^{8}/_{10}$ метра широкій; высота передней стѣнки $^{3}/_{10}$ метра, задней $^{9}/_{10}$ метра. Внутри ящика робится два отдѣлы: первый $^{8}/_{10}$ метр. долгій, вторый $1^{2}/_{10}$ метра долгій; отдѣлы тѣ роздѣлены подолными перекладинами, росположенными такъ одна отъ другой, абы межи ними свободно переходити могли только цыплята. Въ обохъ боковыхъ стѣнкахъ есть выходныи дверцы. Верхъ ящика прикрытый двома дверцэми; дверцы надъ меньшимъ отдѣломъ досчатыи, надъ большимъ — рама съ стеклами для пропуска свѣтла. Обое дверцы на петляхъ. На полъ ящика посыпается песокъ, а въ меньшóмъ отдѣлѣ стелится сѣно или солома. Квоку помѣщается въ меньшóмъ отдѣлѣ, въ бóльшóмъ же ставится кормъ и воду. Въ хорошую погоду квоку и цыплятъ выпускаютъ на свободу, а въ злую — цыплята гуляютъ въ бóльшóмъ отдѣлѣ птичника. Такій ящикъ можно переносити на любое мѣстце двора или сада.

Если цыплятъ водитъ индичка, то ящики треба дѣлати, бóльшихъ розмѣрóвъ.

Если квока блудлива и заводитъ цыплятъ далеко, то треба еѣ держати пóдъ бóльшимъ кошомъ изъ прутьевъ; цыплята выходятъ свободно изъ такой клѣтки, но квока не можетъ выйти.

При вылупленіи изъ яйца цыплёнокъ имѣетъ запасъ жолтка въ своемъ желудку и потому не слѣдуетъ его кормити по крайней мѣрѣ черезъ добу, воду же можна давати не раньше, якъ по истеченіи двохъ добъ (сутокъ), ибо инакше нарушается пищевареніе (травленье) цыплятъ.

Отъ 2 до 5-го дня вылупившихся цыплятъ кормятъ только однимъ на твердо свареннымъ и дрóбно изрубленнымъ свѣжимъ яйцемъ, задаючи его по-немногу що 2 годины, т. е. 8 разóвъ

на добу. Дальше яйце можно мѣшати съ свареною кашею изъ пшона, задаючи кормъ щó три години, т. е. 6 разóвъ на добу. Около 10-дня дня перестаютъ яйце давати и до конца мѣсяца кормятъ кашою изъ пшона, ячменныхъ или гречаныхъ крупъ и хлѣбными крошками. Затѣмъ подкормливаютъ просомъ, сырыми ячменными или гречаными крупами и наконецъ въ второмъ мѣсяцѣ даютъ розмоченныи зерна овса, ячменя, пшеницы. Зерна и сырыи крупы лучше давати вечеромъ на нóчь, а рано кашу, ибо каша легче и быстрѣйше переваривается (травится) и потому при дачѣ каши на нóчь цыплятамъ пришлось-бы долго до рана голодати.

Пища трехмѣсячныхъ цыплятъ майже ничѣмъ не отличается отъ пищи взрослыхъ птицъ. Питье ихъ во все время воспитанія составляетъ одна чистая вода, которая должна перемѣнятися ежедневно два разы. Зелень (ярина) цыплятамъ всегда полезна, въ особенности же имъ необходимо задавати еѣ тогда, если они выведены въ такую пору (н. пр. раннюю весну), коли не можно ихъ выпускати на траву. Дается листья салаты, свѣжую капусту, бураки, морковь, рѣпу и т. п. Полезно давати цыплятамъ муравельныи яйца, дрóбно изрубленное мясо, творогъ и розличныхъ червей. Отъ такого корма они быстро ростутъ и скорше оперяются.

Цыплятъ треба такъ кормити, абы они всегда были сыты. Количество потребной для нихъ пищи зависитъ отъ породы, т. е. величины ихъ. Если они могутъ по цѣлыхъ дняхъ бѣгати на открытомъ воздусѣ, рытись въ землѣ и отыскивати въ травѣ червякóвъ, то корма треба немного.

Цыплятамъ задается, особенно въ первыи недѣли, цѣннѣйшій кормъ. Отже абы курки не съѣдали его, треба для цыплятъ сдѣлати особную к о р м у ш к у. Есть то корытце, имѣющее сверху проволочныи дужки (каблучки) такъ росположенныи, щобы цыплята свои головки могли свободно пересовывати межи дужками и жерти, взрослыи же куры не могли просунути своихъ головъ.

Для дачи цыплятамъ воды выробляютъ особныи водопойки изъ бляхи и стекла. Мы рисункôвъ ихъ не помѣщаемъ, ибо желающій ихъ употребляти, и такъ можетъ ихъ увидѣти, купивши въ торговлѣ.

Штучное высиживанье цыплятъ.

Цыплята (курята) суть лакомою стравою для богатшихъ людей и для того коло великихъ городовъ, въ которыхъ есть больше количество зажиточныхъ людей, посредствомъ особныхъ аппаратовъ выгрѣваютъ изъ большого числа яецъ (200—300) цыплята, которыи потомъ штучно плекаютъ.

Аппараты такіи съ прирядами до огрѣванья суть дорогіи и при томъ при каждомъ аппаратѣ треба научитися съ нимъ обходитись. Есть аппараты огрѣваныи горячою водою, вырабляемыи въ Франціи (Навета въ Рансуръ и Рулье-Арнульта) — есть аппараты огрѣванныи посредствомъ нафтовыхъ лямпъ системы Сарторія. Покупающій такій аппаратъ получаетъ и наставленіе, якъ съ нимъ обращатись. Изъ взгляда, що тѣ приборы дорогіи и наше населеніе еще не пріучилось къ натуральному раціональному (умному) птицеводству, мы тѣхъ аппаратовъ въ сей книжочцѣ не описуемъ.

Валошенье когутôвъ.

На каплунôвъ выбирается межи однорочными когутами такихъ, у которыхъ нѣтъ коронообразного гребеня, щёчки которыхъ синіи. Найлучшая пора для валошенья есть, если молодыи когутики начинаютъ пѣти, т. е. въ 12 недѣль по ихъ вылупленью. Выскубуется осторожно пера поодиноко подъ задницею на добрый палецъ широко, робится попередъ живота острымъ перочиннымъ ножйкомъ (сцизорикомъ) прорѣзъ на 3 центиментры, абы указательнымъ пальцемъ можно внутрь сягнути. При прорѣзѣ треба быти осторожнымъ, абы не ушкодити кишокъ. Если

черезъ сдѣланный отворъ видны внутренности, обмочивается палецъ оливою, всувается его лѣвою стороною прорѣза обокъ внутренностей вверхъ къ хребту, где-то по обомъ сторонамъ дасться почувствовати ядро формою продолговатого облупленного мигдалового зерна и снимается осторожно сперва правое, затѣмъ лѣвое ядро.

Сдѣлавши то, для скорого загоенья раны и предупрежденія воспаленья, вкладается въ прорѣзъ кусникъ свѣжого масла величиною лѣскового орѣха, впирается старательно выступающіи внутренности, зашивается тоненькою иголкою и шолковою ниткою отворъ, обезпечается конецъ узелочкомъ, смаруется еще отворъ оливою и посыпуется чистою просѣяною золою.

Потомъ обрѣзуется каплуну обѣ остроги на ногахъ и гребень съ звонками, ибо въ противномъ случаѣ тѣ части занадто-бы росли и мѣшали каплуну въ зрѣніи Раны намазуется оливою и посыпуется чистою просѣянною золою.

Валашенныхъ когутовъ треба 8 дней добре кормити въ курятнику пивомъ и хлѣбомъ или горячою водою паренными зернами и давати имъ много свѣжей воды, ибо вывязавшаяся отъ загноенія раны горячка вызываетъ сильную жажду.

Каплуны ростутъ скоро, не линяютъ, получаютъ охрыплый голосъ и толстѣютъ.

Также курки валашатъ и тогда ихъ называютъ пулярдами. Курочцѣ выскубуется перье въ томъ мѣстцѣ за задницею, где находится подъ кожею бѣлый круглый бугорокъ величины малого лѣскового орѣха, робится зарѣзъ острымъ перочиннымъ ножикомъ величины фасоли, почемъ можно узрѣти матку въ видѣ круглой бѣлой наросли. Если пальцемъ потиснути подъ задницею немножко на внѣ, матка выступаетъ изъ прорѣза. Оттинается еѣ тогда ножичками тамъ, где она приросла и затѣмъ либо отворъ оставляется открытымъ и замазывается масломъ и золою, или — що лучше . вкладается немного масла, зашивается, замазуется оливою и засыпуется золою. Также валашенымъ куркамъ оттинается гре-

бень и звонки. Кормленье такихъ курокъ, якъ у каплунôвъ. Они скоро толстѣютъ.

Болѣзни куръ.

Первымъ правиломъ есть, абы больныхъ изолировати (отособнити), ибо большинство болѣзней заразительны.

Предохранительнымъ средствомъ отъ болѣзней есть здоровое помѣщеніе — и подстилка изъ розробленного торфа, который есть найлучшею дезинфекціею*) въ семъ случаю и даетъ тепло и сухость. Куры легко заболѣваетъ тогда, когда ихъ держится ночью въ теплыхъ курятникахъ и рано выпускается на холодный воздухъ. Обыкновенныи болѣзни у куръ есть:

Нарывы (болячки). Они происходятъ отъ простуды и наглого охлажденія крови — особенно, коли день былъ жаркій а наступила нôчь холодная, если кура была на протягу и въ сырости (мокротѣ). Если куры привыкли ночевати на деревахъ и наразъ ихъ перевести въ теплый курятникъ или закрытый ящикъ, они заболѣваютъ нарывами. Также куры, высылаемыи желѣзною дорогою и оставляемыи цѣлыми годинами въ клѣткахъ на перонѣ на протягахъ, заболѣваютъ нарывами.

У простудившойкуры въ первое время истекаетъ слизь изъ ноздрей на подобіе чистой воды и если не обращается на то вниманіе и не лѣчится, то появляется кашель и чиханье, ибо возникаютъ въ ноздряхъ нарывы (болячки). Если показалися первыи признаки болѣзни, треба оглянути птицу, нѣтъ-ли у ней въ ротѣ и горлѣ бѣлыхъ пятенъ и болячокъ и не чути-ли хрипящого дыханія.

---

*) Дезинфекція — есть нищенье всего заразительного въ воздусѣ, стѣнахъ, подлозѣ, предметахъ розличныхъ. Средствами дезинфекціи есть: спалити зараженную вещь, великая жара (200—300°), морозъ (по крайней мѣрѣ 35°), высушованье, солнечное свѣтло, электрика, сѣрная и соляная кислоты, сулема, карболь, вапно, хлористое вапно, деготь, хлоръ, также торфъ.

Ноздри треба промыти роспущеннымъ въ водѣ алуномъ Мачается перо въ ростворѣ алуну и мажется горло птицы.

Въ дальшомъ теченіи болѣзни слизь роспространяется внизъ къ горлу и дѣлаетъ дыханіе затруднительнымъ и нарывы принимаютъ характеръ дифтерита. Густая липкая матерія покрываетъ языкъ, ротъ и роспространяется внизъ къ пищеводному горлу; языкъ высувается изъ рта и птица кажется якъ-бы постоянно глотающой.

Если имѣется осмотрѣти горло, то одинъ человѣкъ, взявши птицу, открываетъ ей ротъ и надавливаетъ большимъ и указательнымъ пальцами дыхательное горло и тѣмъ способомъ заставляетъ его выдвинутись вверхъ, отчего горловый отворъ дѣлается виднымъ. Тогда другій человѣкъ обмокиваетъ перо въ ростворѣ алунового порошка и смазываетъ нимъ горло птицы. Отворъ горла есть маленькій, такъ що довольно трудно ввести перо въ дыхательную трубку. Перо вводится на глубину около 3 центиметровъ, обертается въ горлѣ два-три разы и легко вынимается. Обыкновенно къ нему прилѣпаютъ кусочки бѣловато-темной матеріи. Ту матерію треба изъ горла удалити. Если не удалось сразу то сдѣлати, то дѣлается тоже самое на слѣдующое утро. Если сыровидная масса выростаетъ снова, поступается, якъ прежде, при чѣмъ треба употребляти новое перо, прежнее же спалити. По употребленіи алунового роствора треба смочити горло птицы кôлькома каплями оливы.

Часомъ матерія образуется по сторонамъ рта и въ такихъ случаяхъ лице птицы кажется опухлымъ. Безъ лѣченія птица сдыхаетъ.

Опухоль на лицѣ, если роспространится вокругъ очей, влечетъ за собою потерю зрѣнія у птицы. Тогда птицу треба зарѣзати.

Если такая больная птица имѣетъ трудный отдыхъ, даютъ ей одну чайную ложочку оливы и затѣмъ по двохъ годинахъ одну-двѣ ложочки рицинусового олѣю. Если дыханіе дуже тяжкое, смаруютъ мѣстце, где легкіи (плуца). Мѣстце, где

легкіи, нетрудно познати; оно подъ крылами, свободное отъ перьевъ и тутъ можно замѣтити движенія грудной клѣтки при дыханіи.

Пареное льняное сѣмя дѣйствуетъ яко укрѣпляющое средство. Его сыплется въ холодную воду и ставится на слабый огонь, щобы половину годины кипѣло не сильно. Если до того прибавити немного цитринового соку, то еще лучше. Сѣмя такое дается на столько теплымъ, щобы птица могла ѣсти. Курка можетъ съѣсти 3 чайныи ложки — когутъ 8 и 9. Если съѣдятъ больше, не повредитъ.

Здоровы-ли куры? — осмотривается вечеромъ въ курятнику, особенно въ осенніи и зимніи мѣсяцы, ибо тогда они найбольше заболѣваютъ.

Куръ, перебывшихъ болѣзнь, выпускается сначала въ теплѣйшій день въ полудне на дворъ, но не на долго.

И молодыи цыплята подпадаютъ той болѣзни. Они тогда обыкновенно пьютъ много воды, що имъ однако вредитъ, ибо производитъ розвольненье. Совѣтуютъ имъ давати два-три раза лише въ день пити и дати въ воду кусникъ камфоры. Въ кормъ даютъ порошокъ изъ смеленного кристального алуна.

Болѣзнь печенки. Къ той болѣзни розположены куры, содержащіися въ заключеніи и также отъ недостатка зеленой пищи, камней. Если болѣзнь возникла изъ заключенія, то найлучшимъ лекарствомъ есть пустити ихъ на зеленую траву. Впрочемъ трудно такихъ куръ лѣчити и ихъ найлучше заколоти.

Признаки той болѣзни есть: желтоватый оттѣнокъ въ лицѣ, въ особенности вокругъ очей, очи тустклыи, пьютъ мало, немного ѣдятъ мягкого корма, но за то ѣдятъ бôльше твердого зерна, въ особенности любятъ кукурузу, ходятъ якъ-бы спутанныи, идучи, немного хромаютъ на одну ногу.

Лекарствами на ту болѣзнь можно рекомендовати единственно цикорій-траву, салату и шандру (по-польски міодунка, плуцникъ). Двѣ первыи рѣжутся на мелькіи кусочки и даются курамъ.

Шандра варится 15 минутъ и дается въ видѣ отвара. Двѣ галузки выстарчатъ на 15—12 куръ. Лучше шандру смѣшати съ кормомъ.

Слабоногость у молодыхъ когутиковъ вслѣдствіе быстрого роста. Когутикъ спотыкается, при клеванію корма сидитъ на колѣнахъ, часто падаетъ на землю.

Лекарствомъ есть — мясо, костяная мука въ кормъ и ночлегъ на соломѣ, сѣнѣ, торфѣ. Лучше однако зарѣзати такую птицу.

Зѣвота у цыплятъ (курятъ) происходитъ отъ маленькихъ червячкôвъ въ дыхательной трубцѣ. Отъ той болѣзни гибнутъ курята.

Средствомъ лѣчебнымъ есть: въ ящикъ, где находится не много вапна, дати кôлька маленькихъ кусочковъ камфоры, вложити больныи курята, встряхнути ящикъ; цыплята махаютъ крылами и производятъ пыль, которую вдыхаютъ, кашляютъ и отъ пыли я выдѣляютъ изъ горла черви. Если очи цыплятъ зашли пылью, вытерти ихъ,— не обмывати. Другій способъ лѣченья есть вытиранье горла перцемъ Seyes' Desinfectant'омъ (одна ложечка того плына смѣшанная съ столовой ложкой воды).

Чахотка (сухоты). До той болѣзни склонны доркинги и гамбургскіи куры, особенно цыплята. Такіи хорыи птицы достаютъ долшій клювъ, блѣдое лице, крыла ихъ повисли до земли, походка слабая, тѣло худѣетъ. Единственное средство транъ — если задается въ началѣ болѣзни.

Болѣзни гребня. На гребнѣ являются маленькіи бѣлыи пятна, которыи перекидаются на очи и неразъ на шію. Пораженную тою болѣзнью птицу треба отдѣлити отъ другихъ, щобы они не заразилися. Тѣ бѣлыи пятна въ короткомъ времени переходятъ въ полипы, если ихъ не лѣчити.

Самое лучшее средство есть Seyes Desinfectant. Берутъ перо, обдираютъ его такъ, щобы только конецъ остался оперенный, мачаютъ въ жидкости и мажутъ каждое пораженное мѣстце такъ, щобы жидкость не роспространялася далеко внизъ и не розъѣдала здоровыхъ тканей. Если она попадаетъ на лице или здоровыи мѣстця

гребня, треба ихъ обтерти полотняною шматкою (тряпинкою). Потомъ треба каждое пятно смазати несоленымъ масломъ или оливою. При томъ даютъ птицѣ чайную ложку оливы въ первыи два-три дни два разы на день. Вмѣсто Seyes Desinfectant можно употребляти парафинъ (олѣй нафтяный) или простую сѣрчаную масть.

Воспаленье легкихъ. Теплое вареное льняное сѣмя есть найлучшимъ лекарствомъ. Курку треба посадити въ теплое мѣстце и задавати сверхъ того одну чайну ложочку глицерины каждый день. Область тѣла, где лежатъ легкіи, смазати іодомъ. Послѣ іода смазати вазелиною, инакже кожа достанетъ трещины. Симптомы болѣзни: тяжкое дыханіе, открытый ротъ, курка пьетъ много воды. Выздоровѣвшихъ куръ не можно черезъ якій-то часъ пускати на холодный воздухъ.

Опухоли лапъ у куръ являются у цыплятъ и у старыхъ куръ. У цыплятъ оно происходитъ отъ ревматизма, у старшихъ куръ отъ ударовъ о твердый предметъ.

Признакомъ той болѣзни есть хроманіе. Если то замѣчено во-время, къ нозѣ прикладается припарка изъ хлѣба или отрубей. Припарку треба класти два раза въ день. Въ подошву лапы треба втирати арнику, смазывати вазелиною и обязати кусочкомъ полотна.

Судороги (корчи). Ранніи цыплята въ холодную погоду часто страдаютъ отъ той болѣзни въ возрастѣ отъ одной до 6 недѣль. Вслѣдствіе болѣзни пальцы сводятся и цыплёнокъ падаетъ, стараючись ходити. Если то замѣтится, ноги треба натерти терпентиною и втерти немного вазелины. Затѣмъ берется кусочокъ палочки съ трема розвѣтвленіями на концѣ, такой формы, якъ лапа птипы. Пальцы обвертаются кусками ваты и каждый палецъ привязуется отдѣльно къ одному изъ рожковъ палочки. Цыпленка кладутъ въ ящикъ на волну (шерсть) или на фланелю и держатъ нѣсколько часовъ. Днемъ ихъ держатъ въ ящикѣ, а ночью сажаютъ подъ курку. Вмѣсто палочки еще лучше употребити паперовый картонъ. Каждый палецъ обвертается въ шерстяную

UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN LIBRARY

вату, кладется на картонъ и пришивается отдѣльно сученою пряжею къ картону, щобы пальцы не могли освободитись.

Судороги тѣ происходятъ отъ твердой или каменной подлоги, особенно холодной.

Такая болѣзнь есть у старшихъ куръ и всего чаще случается зимою и весною въ время кладки яецъ и такіи куры несутъ мягкіи яйца. Такимъ курамъ опускается ноги въ горячую или теплую воду — такой теплоты, щобы могъ выдержати палецъ. До воды дается немного горчицы. При томъ хорошо ростирается щѣточкою ноги. Вынявши курку изъ воды, ноги еѣ вытираются на сухо, потираются терпентиною, мажутся вазелиною, обвертаются волняною ватою или фланелью и птицу кладутъ въ теплое мѣстце. Такіи куры треба держати на подстилцѣ изъ торфа или на соломѣ, щобы сохранялась теплота въ ногахъ и циркуляція крови была свободна.

Мягкіи яйца. Иногда куры кладутъ такое громадное количество яецъ, що организмъ ихъ не въ состояніи выробити достаточное количество скорлупы. Другіи куры кладутъ двухъ-жолтковыи яйца. То означаетъ уже слабость пищеварительныхъ органовъ. Также ожирѣвшіи (потолстѣвшіи) куры часто кладутъ мягкіи яйца. Часто случается, що у испуганной курки мягкая скорлупа яйца лопаетъ и она отъ того сдыхаетъ.

Щобы скорлупа яецъ получила нужную твердость, на то найлучшимъ средствомъ есть костяная мука, старое вапно въ кормѣ, кремневый песокъ. Такій песокъ добре есть давати курамъ три разы въ недѣлю.

Поѣданіе яецъ, хотя не есть болѣзнью, но все таки недостаткомъ куръ. Именно нѣкоторыи куры имѣютъ привычку ѣсти яйца, а такъ якъ изъ яйца не останется и слѣда, то даже трудно то провѣрити. Щобы курокъ отъ того отзвычаити, робятъ такъ: берутъ яйце, выпускаютъ бѣлокъ, желтокъ смѣшиваютъ съ горчицею и аммонякомъ, наполняютъ нимъ пустую скурлупу и кладутъ на дворѣ. Курка съѣдающая яйца, когда узритъ приманку, кинется на ню и станетъ клювати, но жгучіи вещества еѣ отстрашатъ и она,

если такій способъ и другій разъ повторится, наберетъ отвращенія къ яйцу. Если то не помогаетъ, лучше курку продати или зарѣзати. При томъ въ предупрежденіе того недостатка треба куркамъ подавати такіи вещества, которыи образуютъ скорлупу, ибо курки съѣдаютъ яйца головно для скорлупы.

Типунъ (пипоть). Болѣзнь сходная съ насморкомъ (катаромъ) у людей. Носъ затикается слизею, такъ що куры для дыханія открываютъ клювъ и стараются воздухъ хватити ртомъ. Возникаетъ ствердѣніе верхушки языка, на которомъ образуется мала тверда бѣла скôрка. Если болѣзнь продолжительна, текутъ съ носа и съ открытого рта сопли мокроты. Болѣзнь происходитъ отъ нечистой воды, которую куры пьютъ.

Лѣченіе: осторожно снимати слизь съ языка — смаровати языкъ несоленнымъ масломъ или жирною сметаною — или нѣсколько разовъ покропити языкъ нѣсколькими краплями винного уксуса (оцту), въ которомъ ростворено немножко поваренной (кухонной) соли.

Въ одномъ случаѣ заперли два когуты страдающіи типуномъ (пипотью) въ коминъ. Они жерли глину и хрустали изъ сажи и вылѣчилися.

Линяньe т. е. выпаданье перьевъ есть для всѣхъ птицъ болѣзнію. Хорошій сильный кормъ помогаетъ птицамъ ту болѣзнь перенести. Холодъ вредитъ имъ въ такой болѣзни и для того треба ихъ держати въ теплыхъ курятникахъ.

Болячковаты очи. Очи становятся сначала воднистыми, потомъ выдаютъ легкую пѣну и въ концѣ наполняются жолтавою слизею, которая затикаетъ носъ У мясистыхъ крѣпкихъ куръ употребляется на ту болѣзнь вытисненный изъ свѣжого коровяного гною сокъ, которымъ запускается очи — у молодшихъ слабшихъ куръ употребляется цинковую воду, которою треба очи и носъ дневно нѣсколько разôвъ вымыти. Также внутреннее задаванье трану (ложочка на день) помогаетъ.

Поносъ (розвольненье). Приходитъ отъ нездорового корма или мокроты въ воздусѣ. Задницу треба старательно чистити, посыповати курятникъ

свѣжимъ пескомъ, давати курамъ сушеныи и въ червономъ винѣ сваренныи черницы и до питья желѣзную воду. Въ зимѣ можно таку воду приготовити, кинувши до снѣговой воды желѣзныи кусники. Яко кормъ найлучше служитъ пражены и затѣмъ смеленный овесъ смѣшанный немножко съ вапномъ и намоченный червонымъ виномъ; до того додати кôлька яловцевыхъ зеренъ.

Запоръ (затвердженье) возникаетъ отъ роспаляющого корма, конопляныхъ сѣменъ, жита, шпараговыхъ зеренъ. Лекарствомъ есть капуста, салата, шафранъ въ свѣжой водѣ, въ случаѣ потребы даютъ левативу изъ зимной воды или оливы.

Воспаленье, затвердѣлость или гноенье желѣзы на концѣ хребта. Лѣчится подаваньемъ мягкого корма, легкимъ натираньемъ мастью алтеа, несоленымъ масломъ или коллодіумомъ и старательнымъ выгнетаніемъ гною.

Опухоль зоба (воля) происходитъ отъ жарлочной ѣды куръ. Внутрь дается курамъ нѣсколько зеренъ бѣлого перца съ несоленнымъ масломъ и выдушуется легко въ зобѣ (волю) находящіися комки. Если болѣзнь упорная, росгинается шія въ мѣстцѣ, где есть комки, вынимается ихъ, зашивается рану шолковою ниткою и насмаруется несоленнымъ масломъ. Если бы выступила внутренность треба еѣ всунути, посмаровавши оливою.

Воши куриныи. Отъ нихъ неоднократно гибнугъ цѣлыи стада. Страдающую цтицу смаруется сѣрою мастью, впихается въ старый мѣшокъ, щобы только голова выставлена и такъ оставляется еѣ цѣлую ночь. Слѣдующого дня птицу мыется водою и мыломъ, мѣшокъ же треба въ огню сожечи.

Куры страдаютъ также отъ глистôвъ въ внутренностяхъ, противъ которыхъ пока нѣтъ средствъ.

Храненіе яецъ.

Яйца служатъ яко пища (поживленье) и для техничныхъ цѣлей въ промышленности. Яко пища

занимаютъ они одно изъ первыхъ мѣстць межи другими стравами. На 1000 частей яйца припадаетъ $134^{34}/_{100}$ частей бѣлка, который составляетъ самую важную часть пищи необходимой для человѣка. Въ 14 яйцахъ есть столько поживныхъ частей, щó въ одномъ фунтѣ мяса. Древніи римляне начинали каждый свой обѣдъ отъ яйца — для того возникла латинская поговорка, употребляемая еще нынѣ: ab ovo — т. е. съ начала.

Кромѣ того яйца употребляются въ техницѣ, т. е. въ промышленности. Именно яичный жолтокъ употребляется въ сыромятничествѣ (гарбарствѣ деликатныхъ скôръ) до выправленья кожи на перчатки (рукавички), до выправы скôръ ягнятъ, козъ и до выробу мыла. Яичный бѣлокъ употребляется при очистцѣ сирупôвъ, овочевыхъ сокôвъ, вина, розличныхъ жидкостей, дальше при золоченью дерева, при малёванью на кожѣ и на паперѣ, въ фотографіи; употребляемый для фотографіи албуминовый паперъ изготовляется при помощи яичного бѣлка.

Великое примѣненіе яичный бѣлокъ маетъ при фарбованью матерій. Всѣ тѣ хустки, которыи на головахъ нашихъ женщинъ, тѣ матеріи, изъ которыхъ ихъ платье — тѣ фабричныи матеріи, въ которыи одѣваются наши мущины, фарбованы при помощи яичного бѣлка. Середняя фабрика такихъ яецъ употребляетъ годично 2—3 миліоны штукъ.

Потому яйцами ведется оживленная торговля такъ для консумціи (ѣды), якъ и для промысла. По той причинѣ треба знати, якъ яйца сохраняти.

Прежде всего треба уважати, абы хранимыи особенно для ѣды яйца были незаплоднены, ибо заплодненныи яйца скоро портятся (псуются). Незаплодненныи яйца найбôльше есть отъ кладокъ въ мѣсяцахъ мартѣ, апрѣлѣ, августѣ и слѣдующихъ мѣсяцахъ. Въ мѣсяцахъ маѣ, въ червнѣ и іюлѣ уже труднѣйше о незаплодненныи яйца. Найлучше въ семъ отношеніи куповати яйца въ мартѣ и апрѣлѣ.

Въ погребѣ (пивницѣ) ихъ не можно держати, также не вольно ихъ держати въ мѣстцяхъ,

где находятся сильно пахнучіи вещи, или въ мѣстцяхъ, где лѣтомъ за горячо.

Найлучше класти яйца на продѣравленныхъ доскахъ съ квадратными (не круглыми) дѣрами такой величины, абы яйце не выпало. Що 8 дней треба ихъ перевертати, такъ щобы разъ тупый, другій разъ острый конецъ былъ горою. Если въ томъ мѣстцѣ есть провѣвъ воздуха, то яйца хорошо сохраняются.

Средства, абы воздухъ до яйца не допускати не всегда имѣетъ успѣхъ, ибо въ яйцѣ самомъ есть всегда немного воздуха, который можетъ вызвати гнитье. Найлучше еще яйце погружити въ горячомъ ростворѣ гуммы, скоро выняти и посыпати гипсовымъ порошкомъ. Такіи яйца для твердой скорлупы надаются для транспорта.

Вкладаютъ также яйца въ ростворъ соли (1 часть соли, 10 частей воды), повлекаютъ воскомъ и жиромъ (тлущомъ), или вкладаютъ въ вапно, однако въ такомъ случаѣ они стаются невкусными. Фунтъ вапна скрапляется половиною фунта воды, мелется на порошокъ, розмѣшается его добре въ 30 фунтахъ воды. На днѣ бочки или горшка сыплется слой песку и укладается яйца такъ, абы одно другого дотыкало и такъ укладается одну верству на другой (12—1 верствъ — не больше!), по чѣмъ вливается добрб порушенное вапняное молоко такъ, абы оно еще 10—12 центиметровъ стояло надъ верхною вере ствою яецъ. Бочку треба добре прикрыти и поставити въ холодномъ мѣстцѣ, однако такомъ где не мерзнетъ.

Замерзлыи яйца, абы сдѣлати годными для употребленія, кладется на 2—3 годины въ добре зимную воду.

Простый способъ храненія яецъ есть укладати ихъ въ ящики или коши, перекладати сухою соломою или пересыпуючи сухимъ овсомъ, ящики и коши ставятъ въ холодныхъ и сухихъ помѣщеніяхъ. Также сохраняютъ яйца въ деревяной просѣянной золѣ, укладаючи ихъ такъ, щобы одно не прикасалось къ другому. Также смазываютъ бѣлымъ, самимъ лучшимъ вазелиномъ.

Абы познати, свѣжи-ли яйца и хороши, держится ихъ, якъ выше сказано, противъ свѣтла. Свѣжіи суть прозрачны и маютъ дуже малый воздушный пузырь (баньку) въ верху. Чѣмъ бôльшій тотъ пузырь, тѣмъ скорше будутъ гнити; совсѣмъ непрозрачныи суть гнилыи. У доброго яйца, если легко языкомъ доткнутись верха тоншого, то будетъ немного высшая температура (теплота), чѣмъ у тупого конца; злыи яйца ровномѣрно теплы на обохъ концахъ. Свѣжіи яйца, вложеныи на верхъ воды, погружаются — гнилыи плывутъ на верху. Если свѣжое яйце дати въ солянку, то оно повольно погружается.

Транспортъ яецъ на дальшое отстояніе.

Въ виду спроса яецъ для бôльшихъ городовъ и для фабрикъ по селамъ шатается много скупщикôвъ-жидôвъ, которыи купуютъ яйца для купцевъ-экспортерôвъ, высылающихъ ихъ желѣзницею въ Нѣмеччину и Англію.

Яйца идущіи далекою дорогою за-границу потребуютъ особенно тщательно упаковки (укопорки). Для той цѣли берутся долгіи, на два отдѣленія поперечною доскою роздѣленныи ящики не тѣсно сбитыи изъ тонкихъ досокъ-шелевокъ. Шелевка-доска должна быти по возможности сухая, що необходимо для найлучшого сохраненія яецъ и полученія лекшой тары*) упаковочного матеріала. То послѣдное обстоятельство имѣетъ бôльшую важность въ виду дорого стоящого перевоза.

Въ готовыи ящики кладется тонкимъ слоемъ сухая, чистая, неперебитая солома, затѣмъ на такую солому кладутъ яйца въ одинъ рядъ, плотно (густо) одно къ другому; на рядъ яецъ — опять тонкій слой соломы, опять рядъ яецъ и т. д. На послѣдній рядъ кладется слой такой же соломы а затѣмъ прибивается крышка не плотно сбитая, Въ послѣднее время солому стали замѣняти древесными стружками.

---

*) Тарою называется вага опакованья товара — вага (вѣсъ) чистого товара называется нетто.

Каждая половина ящика содержитъ въ собѣ 4 слои яецъ, каждый слой имѣетъ 10 рядовъ, а каждый рядъ — 18 яецъ. Такимъ образомъ въ каждую половину ящика входитъ 720 яецъ, а въ цѣлый ящикъ 1440 штукъ, що по заграничному счету составляетъ 24 шоки (копы), числячи на одинъ шокъ (копу) 60 штукъ. Если купецъ яйце куповалъ по 5 гелер., то стоимость ящика безъ взыска — 72 кор. Въ вагонъ грузится (ладуется) 100—108 ящиковъ, въ зависимости отъ ваги упаковки (тары). Если яйце было куплено по 5 гел., то вагонъ яецъ стоитъ его 7200 кор. — онъ продаетъ его на пр., за 10.000 кор. (7 гел. яйце), и хотя отчислити кошта транспорта, для него остается все-таки громадный взыскъ*).

Отправляемыи для транспорта за-границу яйца должны быти свѣжіи, вполнѣ чистыи и розсортированы по величинѣ съ соотвѣтственными надписями на ящикахъ. Если положити въ ящикъ яйца рôзныхъ величинъ. то покупатели заграничныи за весь товаръ платятъ меньше, чѣмъ за одни только малыи яйца.

Перевозка дорожшихъ куръ.

Дорожшихъ (племенныхъ, т. е. расовыхъ куръ) треба перевозити съ возможно бôльшою осторожностію. Перевозятъ ихъ обыкновенно въ деревяныхъ ящикахъ или кошахъ, сплетенныхъ изъ ивовыхъ прутьевъ, причѣмъ прутья обвиваются соломенными плетѣнками, которыи, придаючи мягкость стѣнкамъ коша, предохраняютъ птицъ отъ ушибôвъ и сильныхъ пораненій при перестановцѣ и переносцѣ кошôвъ. Кромѣ того солома способствуетъ сохранѣнію тепла въ кошахъ, що особенно важно при перевозцѣ птицъ въ холодное время года.

Коши дѣлаются розличной формы и величины, сообразуючись съ количествомъ пересыла-

---

*) Теперь (въ маѣ) купецъ того не заробитъ, а стратитъ при покупцѣ яйца за 5 гел., ибо въ Вѣднѣ ящикъ яецъ prima (1440 штукъ) продается за 70 кор. Яецъ prima идетъ 21 штукъ на килограмъ, sekunda $21^1/_4$—22.

емыхъ въ нихъ птицъ. Сверху коша часть крышки должа быти створная (до отвиранья), а противъ той створной части внутри коша привѣшивается ящичокъ для корма и глиняный горщечокъ для воды. Съ бокôвъ же кошъ снабженъ ручками изъ ивовыхъ прутьевъ или изъ шнурковъ на переноски.

Коши обтягаютъ также грубою плахтою, щобы предохранити птицъ отъ вредного дѣйствія холодного вѣтра, если куръ везется фѣрою.

Для перевозки поручаютъ также ящикъ той формы.



Такіи ящики можно въ вагонѣ ставити одинъ на другій.

Для цыплятъ (курятъ) пересылаемыхъ на далекіи розстоянія рекомендуется ящикъ съ двома крышками. Открывши бôльшую крышку, сажаютъ въ ящикъ пересылаемыхъ цыплятъ — при поднявши меньшую крышку во всякое время легко задати цыплятамъ кормъ, который привѣ-

шивается съ боку ящика. Ящикъ долженъ имѣти двѣ ручки для удобства переноски и съ обохъ сторонъ отворы для прохода свѣжого воздуха. Долгота ящика отъ 36 до 72 центиметровъ, смотря по числу помѣщающихся въ немъ цыплятъ отъ 6—24 штукъ — вышина 36 центиметровъ.

Другіи корысти изъ куръ.

Бережливость (ощадность) не состоитъ въ томъ, абы собѣ отказовати въ ѣдѣ, въ одежи, въ обуви, ибо то все потребно для сохраненія здоровья, отже и силъ для роботы. Бережливость состоитъ въ томъ, абы въ господарствѣ нищо даромъ не пропадало. Такъ и при курахъ треба старатись вызыскати все отъ нихъ происходящее.

Куриный гной есть добрымъ навозомъ для грядокъ шпараговыхъ, сѣножатей и конюшины.

Перье куръ можно употребляти на подушки и перины. Однако въ такомъ случаѣ треба его добре очистити и высушити, ибо въ противномъ случаѣ оно непріятно воняетъ. Пера изъ хвоста фарбуютъ и изъ нихъ робятъ перопуши, мѣтелки. Такіи мѣтелки охотно купуютъ по мѣстахъ для очистки фортепьянôвъ, дробнѣйшихъ дорожшихъ предметôвъ и т. п. Изъ шійного перья робили давнѣйше и теперь начинаютъ снова выробляти муфты, т. е. оболочки для согрѣванія рукъ у женщинъ.

Яко лекарство служитъ, якъ извѣстно, бѣлокъ при опаренью, спеченью человѣческой кожи тѣла. Добре его смѣшати въ такомъ случаю съ сметаною. Жолтокъ есть лекарствомъ противъ желчныхъ каменей, жолтачки и слабостей подбрюшья. Паленная яичная скорлупа есть лекарствомъ на зобъ (воль) — яичная кожица (скôрка) противъ каменовой болѣзни.

Потребность организаціи торговли яйцами у насъ.

Нашъ народъ повиненъ принятись за торговлю яйцами и въ семъ отношеніи починъ дол-

женъ происходити отъ нашихъ крамницъ сельскихъ.

Торговля внутренняя яйцами, т. е. для заосмотренья нашихъ городовъ яйцами есть самая простая и не нуждается въ особной науцѣ. Принятися за ню можетъ каждый изъ нашихъ селянъ — мужчина и женщина. Довлѣетъ, розумѣтися на яйцахъ, знати ихъ цѣну, скуповати, умѣти хранити, упаковати и везти и найти покупателей, чи то среди частныхъ людей, чи то въ лавкахъ (склепахъ). Розумѣется, що первымъ условіемъ есть умѣти раховати, ибо напередъ треба обчислити кошта покупки, упаковки, перевозки, страту труда своего и времени. Тогда можно на-передъ обчислити зыскъ — страту. Особенно Львовъ есть теперь выгоднымъ мѣстцемъ сбыта на яйца — однако только для ближайшихъ сторонъ. Но нынѣ и въ другихъ городахъ провинціальныхъ Галичины населеніе убольшилось и спросъ на яйца есть бо̂льшій. Желательнымъ есть, абы наши люди въ такихъ городахъ открывали лавки (склепы) для продажи масла, сыра, молока, сметаны, яецъ, съ чѣмъ можно соединити и продажу доброго сельского хлѣба, розумѣется, выпеченного примѣнительно въ вымогамъ городского населенія. Хлѣбъ изъ чистой житней муки, жители городовъ предпочитаютъ хлѣбу городскихъ пекарей. Въ такой лавцѣ можно продавати медъ, воскъ, овощи, даже домашнюю птицу — живую и зарѣзанную. Чѣмъ рознороднѣйшіи будутъ продукты, тѣмъ лучше лавка оплатится.

Для торговли внѣшней, т. е. для вывоза яецъ за-границу треба уже и бо̂льшихъ капиталовъ и бо̂льшихъ знаній. Треба не только розумѣтися на яйцахъ и ихъ упаковцѣ, но и знати вести корреспонденцію на чужихъ языкахъ, именно нѣмецкомъ и англійскомъ, треба дальше знати желѣзно-дорожныи предписанія и тарифы такъ Австріи, якъ и другихъ державъ и купеческіи обычаи и законы другихъ сторонъ. До всего того треба особно подготовленныхъ людей съ высшей степенью интеллигенціи. Пока у насъ экспортомъ заграничнымъ яецъ заниматись моглибъ только наши торговельныи товарищества, якъ „Торго-

вый Домъ“ въ Львовѣ, „Народная Торговля“ и т. п. Кромѣ жидовскихъ фирмъ, обогатившихся торговлею яичною, въ семъ году, якъ мы уже сообщили, возникла въ Львовѣ „Galicyjska spółka zbytu jaj i drobiu, stowarzyszenie z ograniczoną poręką“ — основанная ц. к. галицкимъ товариствомъ. Управители сего Общества переговоривали съ Центральнымъ Выдѣломъ Общества им. Михаила Качковского и приглашали наше Общество приняти участіе въ семъ предпринимательствѣ. Центр. Выдѣлъ и такъ обремененный многосложными своими задачами, по совѣту виднѣйшихъ нашихъ экономистовъ, предоставилъ непосредственное участіе въ семъ предпринимательствѣ „Рольничому Союзу“, самъ же изъ своей стороныя заявилъ, що посредствомъ своихъ изданій будетъ поддерживати то товарищество для торговли яецъ, однако подъ условіемъ, абы правленіе его употребляло также нашихъ людей при покупцѣ, упаковцѣ, транспортѣ и въ дѣловодствѣ и наши люди такимъ образомъ пріучились веденію сей отрасли торговли. Адресъ оного Общества есть: Львовъ ул. Ягайлонская ч. 7.

Содержаніе.

Стор.

Передное слово 3
На що годуютъ куры 5

Породы куръ на яйца.

Леггорны 5
Минорки 7
Андалузки 9
Орпингтоны 9
Сессексы 12
Итальянскіи гамбургскіи куры . . . 12
Плимутъ-роки 12
Семиградскіи голошійки 13
Гамбургскіи кохинхины 13

Куры на мясо.

Французскіи куры мясодайныи . . . 14
Доркинги 14
Лангшаны 16

Куры господарскіи или на мясо и яйца.

Польскіи зеленоножки 17
Польскіи незапоминайки 19
Польскіи чубатки (хохлатки), падевки . 19
Чубаты куры другихъ породъ. Гуданы . 20
Кохинхины 21
Мехельскіи кукушки 22
Ваендоты (Віандоты) 23
Брамапутры 24

Куры для забавы (боевыи) 25
Курятники 26
Устройство гнѣздъ для насиживанья . . 31
Кормленье и тученье куръ 32

О насиживанью и уходѣ за цыплятами.

Выборъ яецъ для насиживанья . . . 37
Присмотръ за насѣдкой (квокой) въ время высиживанья 40
Уходъ за цыплятами 41
Штучное высиживанье цыплятъ . . . 45

Валошенье когутовъ 45
Болѣзни куръ 48
Храненіе яецъ 54
Транспортъ яецъ на дальшое отстояніе . 57
Перевозка дорожшихъ куръ . . . 58
Другіи корысти изъ куръ 60
Потребность организаціи торговли яйцами у насъ 60

Где найлевнѣйше складати гроши на процентъ?

Въ регистр. Обществѣ съ обмеж. порукою

„Защита земли“

во Львовѣ ул. Театральная ч. 22.

На желаніе высылаеся чекъ почтовой щадничой касы, которымъ присылка грошей послѣдуе безъ всякихъ коштôвъ.

Где найскорше одержати

ДЕЩЕВУ ПОЖИЧКУ?

Въ регистр. Обществѣ съ огранич. порукою

„Защита земли“

во Львовѣ ул. Театральная ч. 22.

(Народный Домъ.)

Кто желае одержати пожичку нехай пришле судовый вытягъ ипотечный своего грунту и аркушъ грунтовый а такожь марку почтовую на отвѣтъ.

3 0112 098505008